

# 長崎県感染症発生動向調査速報

平成24年第24週 平成24年6月11日(月)～平成24年6月17日(日)


## 定点報告疾患(定点当たり報告数の上位3疾患)の発生状況

### (1) 感染性胃腸炎

第24週の報告数は189人で、前週より11人少なく、定点当たりの人数は4.30であった。

年齢別では、2歳(23人)、10～14歳(23人)、1歳(22人)の順に多かった。

保健所別の定点当たり人数は、県北保健所(9.00)、西彼保健所(6.25)、五島保健所(5.00)が多かった。




### (2) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

第24週の報告数は96人で、前週より35人少なく、定点当たりの人数は2.18であった。

年齢別では、4歳(20人)、6歳(14人)、2歳(13人)の順に多かった。

保健所別の定点当たり人数は、長崎市保健所(6.30)、県央保健所(2.33)、西彼保健所(2.00)が多かった。




### (3) 水痘

第24週の報告数は43人で、前週より8人少なく、定点当たりの人数は0.98であった。

年齢別では、3歳(13人)、2歳(10人)、～11ヶ月(5人)の順に多かった。

保健所別の定点当たり人数は、県央保健所(2.17)、佐世保市保健所(1.67)、舌岐保健所(1.00)が多かった。



○ 当年(長崎県)      — 前年(長崎県)  
× 当年(全国)      - - 前年(全国)

## 季節情報

### 【感染性胃腸炎】

長崎県における第24週の報告数は189人で、前週より11人減少して定点当たりの人数は4.30となり、前週に引き続き全国定点当たりの人数7.37を下回りました。しかしながら、県北地区では9.00と高い値を示していますので、今後の動向に注視していく必要があります。

感染性胃腸炎は、細菌又はウイルスなどの病原微生物による嘔吐、下痢を主症状とする感染症です。年齢別に見ると、報告の多くが1～2歳の乳幼児が占めています。原因はロタウイルス、ノロウイルス、エンテロウイルス、アデノウイルスなどのウイルス感染による場合が主流ですが、細菌性の場合もあります。ロタウイルスについては2011年7月にワクチンが製造承認されており、予防することが出来ます。小さいお子さんがいらっしゃるご家庭では、保護者の方が手洗いの励行、体調管理や体調の変化に心掛けてあげるなどして感染防止に努め、早目に医療機関を受診させてあげるよう心がけましょう。

### 【A群溶血性レンサ球菌咽頭炎】

長崎県における第24週の報告数は前週より35人減少して96人、定点当たりの人数は2.18となり、全国定点当たりの人数2.63を若干下回っています。対馬地区以外から散発的に報告があがっていますが、報告数の変動が大きく、24週では長崎地区からの報告数が全体の半数以上を占め、次いで県央地区の順となっています。前年に比べ報告数が多くなっていますので、注意が必要です。

本感染症の好発年齢は5～15歳で、鼻汁・唾液中のA群溶血性レンサ球菌の飛沫などによってヒトからヒトへ感染します。また、食品を介しての経口感染もあります。潜伏期間は約1～4日で、突然の発熱(高熱)、咽頭痛、全身倦怠感、時に皮疹もあります。急性期患者の感染力は強いですが、適切な抗菌薬の投与により多くは1～2日後には症状も消失し、感染力も著しく低下します。不十分な治療は無症状保菌者を生じやすいため、早期に医療機関を受診するとともに、手洗いやうがいを励行し、感染防止に努めましょう。

【水痘】

長崎県における第24週の報告数は前週より8人減少して43人、定点当たりの報告数は0.98でした。西彼地区を除く全域から報告があがっていますので、今後の動向に注視していく必要があります。

水痘は水疱瘡（みずぼうそう）とも呼ばれ、原因となる水痘帯状疱疹ウイルスは伝播力が強く、ウイルスを含む飛沫あるいは飛沫核を経気道的に吸入することによる飛沫感染あるいは水泡の内溶液と触れることによる接触感染により感染が成立します。手洗いの励行、体調管理に心がけ感染防止に努めましょう。

**トピックス：風疹に気をつけましょう**


風疹（三日はしか）の報告数が過去5年間で本年は急激に増加しており、特に、兵庫、大阪といった関西地域での患者発生の増加が際立っています。その内訳は20～40歳代の男性に多く、風疹ワクチンの接種対象が1994年まで中学生の女子に限られたため、この年齢層には免疫がない男性が多数存在していることが今回の流行に大きく影響しているようです。

第1週から24週までの間、本県での発生報告はいまだありませんが、全国報告数は前週（330人）より63人増加し、393人となっています。また、24週では九州では福岡で届出が2件報告されています。

風疹はせきやくしゃみなどから感染し、通常は発疹や発熱が起こりますが軽微な症状で経過し、重篤化することはほとんどありませんが、妊娠初期3ヶ月までに感染すると、胎盤を経て胎児にも感染し、先天性の心疾患や難聴、白内障などを引き起こす（先天性風疹症候群：CRS）危険性がある恐ろしい感染症でもあります。

風疹やCRSは予防接種により予防可能ですが、妊婦へのワクチン接種は禁忌であるため、妊婦にうつすことのないよう、配偶者や周囲の人は医師と十分相談の上、ワクチンの接種を実施することが重要です。

本県での報告数は少ないですが、今後の風疹の動向に注視して十分に注意しましょう。



過去5年間の全国と長崎県の風疹の報告数の推移

