

課題名	26. チャノキイロアザミウマのカンキツへの加害時期について																																																				
成果の要約	チャノキイロアザミウマのカンキツ果実への主な加害時期は、第3世代幼虫期にあたる6月中、下旬と第5～6世代幼虫期にあたる8月中旬～9月上旬の2回で、5月の開花時期の加害はあまりない。																																																				
成績	<p>第1図 チャノキイロアザミウマのカンキツ果実への寄生時期</p>																																																				
概要	<p>第1表 薬剤処理時期とチャノキイロアザミウマによる果実被害との関係</p> <table border="1" data-bbox="275 1377 1612 2125"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区</th> <th colspan="2">薬剤処理月日</th> <th colspan="4">果実の被害程度(果数)</th> <th rowspan="2">被害度</th> </tr> <tr> <th>5月9日 5月15日</th> <th>6月24日</th> <th>無</th> <th>軽</th> <th>中</th> <th>甚</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>有機リン</td> <td>合ピレ</td> <td>45</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1.7</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>—</td> <td>合ピレ</td> <td>43</td> <td>6</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>3.0</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>合ピレ</td> <td>—</td> <td>20</td> <td>24</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>17.5</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>13</td> <td>25</td> <td>11</td> <td>1</td> <td>21.3</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">(長崎県果樹試験場)</p>							区	薬剤処理月日		果実の被害程度(果数)				被害度	5月9日 5月15日	6月24日	無	軽	中	甚	1.	有機リン	合ピレ	45	5	0	0	1.7	2.	—	合ピレ	43	6	1	0	3.0	3.	合ピレ	—	20	24	6	0	17.5	4.	—	—	13	25	11	1	21.3
区	薬剤処理月日		果実の被害程度(果数)				被害度																																														
	5月9日 5月15日	6月24日	無	軽	中	甚																																															
1.	有機リン	合ピレ	45	5	0	0	1.7																																														
2.	—	合ピレ	43	6	1	0	3.0																																														
3.	合ピレ	—	20	24	6	0	17.5																																														
4.	—	—	13	25	11	1	21.3																																														