

医療用麻薬 廃棄方法推奨例一覧

令和8年2月

長崎県福祉保健部
薬務行政室

Ⅰ 麻薬の廃棄手続について（法第29条・第35条第2項）

麻薬を廃棄する場合は、麻薬の品名、数量及び廃棄の方法について、あらかじめ県知事に届け出る必要があります。ただし、麻薬処方箋により調剤された麻薬は、廃棄について事前に届け出る必要はありません。

（1）陳旧麻薬等の廃棄

古くなったり、変質、破損等により使用しない麻薬を廃棄しようとするとき、及び誤調剤により処方箋持参者に交付出来なくなった麻薬は、あらかじめ県知事に「麻薬廃棄届」を提出し、県の麻薬関係等職員2名の立会いのもとに廃棄してください。

（2）麻薬処方箋により調剤された麻薬の廃棄

麻薬処方箋により調剤された麻薬（誤調剤によって患者に交付出来なくなった麻薬は「調剤された麻薬」ではありません）で、患者の死亡等により遺族等から返納された麻薬は、病院・診療所においては麻薬管理者（麻薬管理者がいない麻薬診療施設においては麻薬施用者）、薬局においては麻薬小売業者（薬局開設者）自ら若しくは管理薬剤師が、他の従事者の立会いのもとに廃棄してください。廃棄は、焼却、放流等麻薬の回収が困難な方法により行わなければなりません。

また、廃棄後30日以内に「調剤済麻薬廃棄届」を県知事に提出しなければなりません。更に、麻薬帳簿への記載が必要です。

なお、30日以内であれば、その間の複数の廃棄をまとめて一つの届出書で提出して差し支えありません。

※詳しくは、長崎県作成の「麻薬及び向精神薬取扱いの手引き」を参照してください。

※医療用麻薬廃棄方法推奨例一覧は、（2）麻薬処方箋により調剤された麻薬の廃棄の廃棄方法の参考としてもらうために作成しています。

目 次

内服薬

アヘン末	1
アヘン散	1
アヘンチンキ	1
アヘン・トコン散	1
アヘンアルカロイド塩酸塩	1
モルヒネ塩酸塩水和物	1
モルヒネ塩酸塩錠	1
パシーフカプセル30mg・60mg・120mg	1
オブソ内服液5mg・10mg	1
MSコンチン錠10mg・30mg・60mg	2
ピーガード錠20mg・30mg・60mg・120mg	2
カディアンカプセル20mg・30mg・60mg	3
カディアンスティック粒30mg・60mg・120mg	3
モルペス細粒2%・6%	4
モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg・30mg「フジモト」	4
MSツワイスロンカプセル10mg・30mg・60mg	4
コデインリン酸塩水和物	4
コデインリン酸塩散10%	5
コデインリン酸塩錠	5
ジヒドロコデインリン酸塩	5
ジヒドロコデインリン酸塩散10%	5
オキノーム散0.5%	6
オキノーム散2.5mg・5mg・10mg・20mg	6
オキシコンチン錠5mg・10mg・20mg・40mg	6
オキシコンチンTR錠5mg・10mg・20mg・40mg	7
オキシコドン徐放錠5mg・10mg・20mg・40mg「第一三共」	7
オキシコドン徐放錠5mg・10mg・20mg・40mg NX「第一三共」	8
オキシコドン錠2.5mg・5mg・10mg・20mg「第一三共」	8
オキシコドン錠2.5mg・5mg・10mg・20mg NX「第一三共」	9
オキシコドン徐放カプセル5mg・10mg・20mg・40mg「テルモ」	9
オキシコドン内服液2.5mg・5mg・10mg・20mg「日本臓器」	10
メテバニール錠2mg	10
ナルサス錠2mg・6mg・12mg・24mg	10
ナルラピド錠1mg・2mg・4mg	11
ペチジン塩酸塩	11
イーフェンバッカル錠50μg・100μg・200μg・400μg・600μg・800μg	11
アブストラル舌下錠100μg・200μg・400μg	12
メサペイン錠5mg・10mg	12
タペンタ錠25mg・50mg・100mg	12

注射薬

アヘンアルカロイド塩酸塩注射液	13
アヘンアルカロイド・アトロピン注射液	13
弱アヘンアルカロイド・スコポラミン注射液	13
アヘンアルカロイド・スコポラミン注射液	13
モルヒネ塩酸塩注射液10mg・50mg・200mg	13
プレペノン注50mg・100mgシリンジ	14
モルヒネ塩酸塩注100mgシリンジ「テルモ」	14
モルヒネ・アトロピン注射液	14
複方オキシコドン注射液	14
複方オキシコドン・アトロピン注射液	14
オキファスト注10mg・50mg	14
オキシコドン注射液10mg・50mg「第一三共」	14
ナルバイン注2mg・20mg	15
ペチジン塩酸塩注射液	15
ペチロルファン配合注LD	15
弱ペチロルファン注射液	15
ペチロルファン配合注HD	15
ペチロルファン注射液	15
フェンタニル注射液0.1mg・0.25mg「第一三共」	15
フェンタニル注射液0.1mg・0.25mg・0.5mg「ヤンセン」	16
フェンタニル注射液0.1mg・0.25mg・0.5mg「テルモ」	16
タラモナール静注	16
アルチバ静注用2mg・5mg	16
レミフェンタニル静注用2mg・5mg「第一三共」	17
ケタラル静注用50mg・200mg・筋注用500mg	17

外用薬

アンペック坐剤10mg・20mg・30mg	18
コカイン塩酸塩	18
デュロテップMTパッチ2.1mg・4.2mg・8.4mg・12.6mg・16.8mg	18
フェンタニル3日用テープ2.1mg・4.2mg・8.4mg・12.6mg・16.8mg「HMT」	19
フェンタニル3日用テープ2.1mg・4.2mg・8.4mg・12.6mg・16.8mg「明治」	19
フェンタニル3日用テープ2.1mg・4.2mg・8.4mg・12.6mg・16.8mg「ユートク」	20
フェンタニル3日用テープ2.1mg・4.2mg・8.4mg・12.6mg・16.8mg「テルモ」	20
フェンタニル3日用テープ2.1mg・4.2mg・8.4mg・12.6mg・16.8mg「テイコク」	21
フェンタニル3日用テープ2.1mg・4.2mg・8.4mg・12.6mg・16.8mg「トーワ」	21
ラフェンタテープ1.38mg・2.75mg・5.5mg・8.25mg・11mg	22
フェントステープ0.5mg・1mg・2mg・4mg・6mg・8mg	22
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg・2mg・4mg・6mg・8mg「第一三共」	23
フェンタニルクエン酸塩1日用テープ0.5mg・1mg・2mg・4mg・6mg・8mg「テイコク」	23
ワンデュロパッチ0.84mg・1.7mg・3.4mg・5mg・6.7mg	24
フェンタニル1日用テープ0.84mg・1.7mg・3.4mg・5mg・6.7mg「明治」	24
フェンタニル1日用テープ0.84mg・1.7mg・3.4mg・5mg・6.7mg「ユートク」	25

内服薬

品 名	包 装	メーカー	組 成	廃 棄 方 法
日本薬局方 アヘン末 (劇) (麻) (要処方)	5g	第一三共	1g中 アヘン末 1g	水とともに下水に放流する。
日本薬局方 アヘン散 (劇) (麻) (要処方)	25g	第一三共 武 田	1g中 アヘン末 0.1g	水とともに下水に放流する。
日本薬局方 アヘンチンキ (劇) (麻) (要処方)	25mL	第一三共 武 田	1mL中 アヘン末 0.1g (モルヒネ1w/v%) 1mL中 アヘン末 0.1g (モルヒネ0.93～ 1.07w/v% 含有)	水とともに下水に放流する。
日本薬局方 アヘン・トコン散 (ドーフル散) (劇) (麻) (要処方)	25g	武 田	1g中 アヘン末 0.1g トコン末 0.1g	水とともに下水に放流する。
日本薬局方 アヘンアルカロイド塩酸塩 (オピアル) (劇) (麻) (要処方)	5g	武 田 (バンオビン)	1g中 アヘンアルカロイド 塩酸塩 1g	水とともに下水に放流する。
日本薬局方 モルヒネ塩酸塩水和物 (塩酸モルヒネ) (毒) (麻) (要処方)	5g	第一三共 シオノギ ファーマ 武 田	1g中 モルヒネ塩酸塩 水和物 1g	水とともに下水に放流する。
日本薬局方 モルヒネ塩酸塩錠 (塩酸モルヒネ) (劇) (麻) (要処方)	PTP 80T ----- 100T	住友ファーマ	1錠中 モルヒネ塩酸塩 水和物 10mg	粉砕して水とともに下水に放流する。
モルヒネ塩酸塩水和物徐放性カプセル パシーフカプセル30mg (劇) (麻) (要処方)	30mg PTP 50cap PTP 100cap	武 田	1カプセル中 モルヒネ塩酸塩 水和物 30mg	水やお湯に入れカプセルが溶解したら、顆粒を乳鉢ですり潰して下水に放流する。
モルヒネ塩酸塩水和物徐放性カプセル パシーフカプセル60mg (劇) (麻) (要処方)	60mg PTP 50cap PTP 100cap		1カプセル中 モルヒネ塩酸塩 水和物 60mg	
モルヒネ塩酸塩水和物徐放性カプセル パシーフカプセル120mg (劇) (麻) (要処方)	120mg PTP 50cap PTP 100cap		1カプセル中 モルヒネ塩酸塩 水和物 120mg	
モルヒネ塩酸塩内用液剤 オプソ内服液 5mg (劇) (麻) (要処方)	5mg×20包	住友ファーマ	1包2.5mL中 モルヒネ塩酸塩 水和物 5mg	水とともに下水へ放流する。
モルヒネ塩酸塩内用液剤 オプソ内服液 10mg (劇) (麻) (要処方)	10mg×20包		1包5mL中 モルヒネ塩酸塩 水和物 10mg	

内服薬

品 名	包 装	メーカー	組 成	廃 棄 方 法
モルヒネ硫酸塩徐放錠 MSコンチン錠 10mg (劇)(麻)(要処方)	10mg 50T 100T PTP 100T PTP 200T	シオノギ ファーマ	1錠中 モルヒネ硫酸塩 水和物 10mg	熱水中に錠剤を入れ30秒間放置した後、棒状のも ので錠剤を潰し攪拌する。 次いで、この中に水を入れて冷却し、錠剤の溶解、 崩壊を確認したのち、下水に放流する。 ※MSコンチン錠の場合、熱水（60℃以上）で素 錠は溶けるが、コーティング皮膜の方は熱水に は溶けず、水に溶ける。 このため、熱水中で一旦コーティング皮膜を棒 状のもので壊し、素錠をほどほどに溶解または 崩壊させた後、熱水を冷却してコーティング皮 膜を溶解し廃棄する手順である。
モルヒネ硫酸塩徐放錠 MSコンチン錠 30mg (劇)(麻)(要処方)	30mg 50T PTP 100T		1錠中 モルヒネ硫酸塩 水和物 30mg	
モルヒネ硫酸塩徐放錠 MSコンチン錠 60mg (劇)(麻)(要処方)	60mg 50T PTP 100T		1錠中 モルヒネ硫酸塩 水和物 60mg	
モルヒネ硫酸塩水和物徐放性製剤 ピーガード錠 20mg (劇)(麻)(要処方)	20mg PTP 14T PTP 50T	田辺三菱 製薬工場	1錠中 モルヒネ硫酸塩 水和物 20mg	① 錠剤を37℃以上の温水（10mL／1錠）の中に入れ、 乳棒で2～3分軽く粉砕しながらかき混ぜる。 ② 錠剤溶解後、約5倍量の水を加えて、上澄みを 注意深く下水に放流した後、コーティング皮膜 を廃棄する。
モルヒネ硫酸塩水和物徐放性製剤 ピーガード錠 30mg (劇)(麻)(要処方)	30mg PTP 14T PTP 50T		1錠中 モルヒネ硫酸塩 水和物 30mg	
モルヒネ硫酸塩水和物徐放性製剤 ピーガード錠 60mg (劇)(麻)(要処方)	60mg PTP 14T PTP 50T		1錠中 モルヒネ硫酸塩 水和物 60mg	
モルヒネ硫酸塩水和物徐放性製剤 ピーガード錠 120mg (劇)(麻)(要処方)	120mg PTP 14T PTP 50T		1錠中 モルヒネ硫酸塩 水和物 120mg	

内服薬

品名	包装	メーカー	組成	廃棄方法
モルヒネ硫酸塩徐放性製剤 カディアンカプセル20mg (制)(麻)(要処方)	20mg PTP 50cap PTP 100cap	住友ファーマ	1カプセル中 モルヒネ硫酸塩水和物 20mg	【大量の場合】 PTPシートからカプセルを取り出し粉碎機にて処理。その後、水とともに下水に放流する。 【少量の場合】 ① カプセル剤を37℃以上の温水(10mL/1cap) 中に入れ、崩壊するまで放置する。 ② 内容物の放出が認められたら、カプセルが溶解するまでときどき攪拌する。 ③ カプセルが溶解後、液を除去し、残留物(粒状)に5倍量のエタノール(95%)を加え、5～10分間攪拌する。 ※ エタノールがない場合には、50～60℃の温水でペレットを湿らせて乳鉢粉碎し、最終的に製剤(粒)1gあたり10mLの温水を加えて乳棒で3～5分かき混ぜることにより、ペレットが崩壊し、モルヒネ硫酸塩水和物が溶解する。不溶性の皮膜は18号篩(目開き：850μm)で除去できる。 * 粒のままでは乳棒で粒がはじき飛ばされる現象が生じるため注意を要する。また、多量の場合も粉碎し難い。 ④ 白濁液に50～60℃の温水をエタノール量の4倍量加え、残存した粒が溶解するまで攪拌する。 * 以上の手順により、カプセル剤は液状となり、液は白濁しているが、モルヒネ硫酸塩水和物は完全溶解している。なお、ゼラチンカプセルの水に対する溶解性は、36℃以下で30分以上要するため、37℃以上の温水を用いる必要がある。消毒用エタノールを用いる場合は、95%の1.5倍量必要。 ⑤ 下水に放流する。
モルヒネ硫酸塩徐放性製剤 カディアンカプセル30mg (制)(麻)(要処方)	30mg PTP 50cap PTP 100cap		1カプセル中 モルヒネ硫酸塩水和物 30mg	
モルヒネ硫酸塩徐放性製剤 カディアンカプセル60mg (制)(麻)(要処方)	60mg PTP 50cap PTP 100cap		1カプセル中 モルヒネ硫酸塩水和物 60mg	
モルヒネ硫酸塩徐放性製剤 カディアンスティック粒30mg (制)(麻)(要処方)	30mg 50スティック	住友ファーマ	1スティック中 モルヒネ硫酸塩水和物 30mg	【大量の場合】 スティックから粒を出し粉碎機にて処理。その後、水とともに下水に放流する。 【少量の場合】 (1) エタノールがある場合 ① ペレット重量に対して5倍量のエタノール(95%)に、ペレットを添加し、5～10分間攪拌する。 ② 攪拌後の白濁した液に50～60℃の温水をエタノール量の3倍量加え、残存したペレットが溶解するまで攪拌する。 * 以上の手順により、ペレットは液状となり、液は白濁しているが、モルヒネ硫酸塩水和物は完全溶解している。消毒用エタノールを用いる場合は、95%の1.5倍量必要。 (2) エタノールがない場合 50～60℃の温水でペレットを湿らせて乳鉢粉碎し、最終的に製剤(粒)1gあたり10mLの温水を加えて乳棒で3～5分かき混ぜることにより、ペレットが崩壊し、モルヒネ硫酸塩水和物が溶解する。不溶性の皮膜は18号篩(目開き：850μm)で除去できる。 * 粒のままでは乳棒により粒がはじき飛ばされる現象が生じるため注意を要する。また、多量の場合も粉碎し難い。 (1) 若しくは(2)の処理後、下水に放流する。
モルヒネ硫酸塩徐放性製剤 カディアンスティック粒60mg (制)(麻)(要処方)	60mg 50スティック		1スティック中 モルヒネ硫酸塩水和物 60mg	
モルヒネ硫酸塩徐放性製剤 カディアンスティック粒120mg (制)(麻)(要処方)	120mg 50スティック		1スティック中 モルヒネ硫酸塩水和物 120mg	

内服薬

品 名	包 装	メーカー	組 成	廃 棄 方 法
モルヒネ硫酸塩水和物徐放性細粒 モ ル ペ ス 細 粒 2 % (劇) (麻) (要処方)	0.5g 40包	藤 本	1包中 モルヒネ硫酸塩水和物 10mg	細粒をすりつぶして水とともに下水に放流する。
	20g		1g中 モルヒネ硫酸塩水和物 20mg	
モルヒネ硫酸塩水和物徐放性細粒 モ ル ペ ス 細 粒 6 % (劇) (麻) (要処方)	0.5g 40包		1包中 モルヒネ硫酸塩水和物 30mg	
	20g		1g中 モルヒネ硫酸塩水和物 60mg	
モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒 モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包 10mg「フジモト」 (劇) (麻) (要処方)	0.5g 40包	藤 本	1包中 モルヒネ硫酸塩水和物 10mg	細粒をすりつぶして水とともに下水に放流する。
モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒 モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包 30mg「フジモト」 (劇) (麻) (要処方)	0.5g 40包		1包中 モルヒネ硫酸塩水和物 30mg	
モルヒネ硫酸塩徐放性カプセル MSツワイスロンカプセル10mg (劇) (麻) (要処方)	10mg PTP 40cap PTP 100cap	帝 國	1カプセル中 モルヒネ硫酸塩水和物 10mg	カプセル剤を水中に入れ、5分程（目安）放置し崩壊させた後、内容物の顆粒の放出が認められたならば、乳鉢ですり潰して、水とともに下水に放流する。
モルヒネ硫酸塩徐放性カプセル MSツワイスロンカプセル30mg (劇) (麻) (要処方)	30mg PTP 40cap PTP 100cap		1カプセル中 モルヒネ硫酸塩水和物 30mg	
モルヒネ硫酸塩徐放性カプセル MSツワイスロンカプセル60mg (劇) (麻) (要処方)	60mg PTP 40cap		1カプセル中 モルヒネ硫酸塩水和物 60mg	
日本薬局方 コデインリン酸塩水和物 (リン酸コデイン) (劇) (麻) (要処方)	5g	第一三共 シオノギ ファーマ 武 田 田辺三菱 製薬工場	1g中 コデインリン酸塩水和物 1g	水とともに下水に放流する。
	25g			

内服薬

品 名	包 装	メーカー	組 成	廃 棄 方 法
日本薬局方 コデインリン酸塩散10% (リン酸コデイン散10%) (劇) (麻) (要処方)	50g	第一三共 シオノギ ファーマ	1g 中 コデインリン酸 塩水和物 100mg	水とともに下水に放流する。
	100g	第一三共 シオノギ ファーマ 住友ファーマ 武 田 田辺三菱 製薬工場		
日本薬局方 コデインリン酸塩錠 (リン酸コデイン錠) (劇) (麻) (要処方)	50T	第一三共 武 田	1 錠中 コデインリン酸 塩水和物 20mg	粉砕して水とともに下水に放流する。
	PTP 50T			
	100T	第一三共 シオノギ ファーマ 住友ファーマ 武 田		
	PTP 100T	第一三共 武 田		
日本薬局方 ジヒドロコデインリン酸塩 (リン酸ジヒドロコデイン) (劇) (麻) (要処方)	5g	第一三共 シオノギ ファーマ 武 田 田辺三菱 製薬工場	1g中 ジヒドロコデイン リン酸塩 1g	水とともに下水に放流する。
日本薬局方 ジヒドロコデインリン酸塩散10% (リン酸ジヒドロコデイン散10%) (劇) (麻) (要処方)	50g	第一三共 シオノギ ファーマ 武 田	1g中 ジヒドロコデイン リン酸塩 100mg	水とともに下水に放流する。

内服薬

品 名	包 装	メーカー	組 成	廃 棄 方 法
オキシコドン塩酸塩散 オキノーム散0.5% (劇) (麻) (要処方)	0.5gSP 30包 ----- 1gSP 30包	シオノギ ファーマ	1包中 オキシコドン塩酸 塩（無水物） 2.5mg ----- 1包中 オキシコドン塩酸 塩（無水物） 5mg	水とともに下水に放流する。
オキシコドン塩酸塩散 オキノーム散 2.5mg (オキノーム散0.5%) (劇) (麻) (要処方)	0.5g 30包		1包中 オキシコドン塩酸 塩（無水物） 2.5mg	
オキシコドン塩酸塩散 オキノーム散 5mg (オキノーム散0.5%) (劇) (麻) (要処方)	1g 30包		1包中 オキシコドン塩酸 塩（無水物） 5mg	
オキシコドン塩酸塩散 オキノーム散 10mg (オキノーム散0.5%) (劇) (麻) (要処方)	2g 30包		1包中 オキシコドン塩酸 塩（無水物） 10mg	
オキシコドン塩酸塩散 オキノーム散 10mg (オキノーム散1%) (劇) (麻) (要処方)	1g 30包		1包中 オキシコドン塩酸 塩（無水物） 10mg	
オキシコドン塩酸塩散 オキノーム散 20mg (オキノーム散2%) (劇) (麻) (要処方)	1g 30包		1包中 オキシコドン塩酸 塩（無水物） 20mg	
オキシコドン塩酸塩徐放錠 オキシコンチン錠 5mg (劇) (麻) (要処方)	5mg 50T PTP 20T PTP 100T	シオノギ ファーマ	1錠中 オキシコドン塩酸 塩水和物 5.77mg 〔無水物として 5mgに相当〕	1. 焼却する。 又は 2. 熱水中に錠剤を約30秒間放置し、棒状の物で錠剤を細かく潰し攪拌する。 次いで、この中に水を入れて冷却し、錠剤の崩壊を確認した後、下水に放流する。 ※オキシコンチン錠の場合、アクリル系の高分子を使用しているので、熱水でも全てが溶解せず複数個の比較的大きな塊が残留する。 また冷水添加はコーティング皮膜を溶解させるための処置である。
オキシコドン塩酸塩徐放錠 オキシコンチン錠 10mg (劇) (麻) (要処方)	10mg 50T PTP 20T PTP 100T		1錠中 オキシコドン塩酸 塩水和物 11.54mg 〔無水物として 10mgに相当〕	
オキシコドン塩酸塩徐放錠 オキシコンチン錠 20mg (劇) (麻) (要処方)	20mg 50T PTP 20T PTP 100T		1錠中 オキシコドン塩酸 塩水和物 23.07mg 〔無水物として 20mgに相当〕	
オキシコドン塩酸塩徐放錠 オキシコンチン錠 40mg (劇) (麻) (要処方)	40mg 50T PTP 20T PTP 100T		1錠中 オキシコドン塩酸 塩水和物 46.14mg 〔無水物として 40mgに相当〕	

内服薬

品 名	包 装	メーカー	組 成	廃 棄 方 法
オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠 オキシコンチンTR錠 5mg (劇)(麻)(要処方)	5mg PTP 20T PTP 100T	シオノギ ファーマ	1錠中 オキシコドン塩酸 塩水和物 5.77mg (無水物として 5mgに相当)	医療機関等における廃棄にあたっては、下記の方法を参考に実施してください。 1：錠剤を焼却してください。 2：粘着力の強いガムテープなどで錠剤を包み、錠剤が見えない状態にして、通常の医薬品と同様に廃棄してください。 または、それ以外の回収困難な方法で廃棄してください。 【注意】 ・ 乱用防止を目的とした製剤のため、水性溶媒中（水、エタノール、酸性又はアルカリ性水溶液）ではpHに関わらずゲル状になりますので、溶解による廃棄は行わないでください。 ・ 硬い製剤で破砕は困難なため、ミキサーを使用した廃棄は行わないでください（刃を傷めることがあります）。
オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠 オキシコンチンTR錠 10mg (劇)(麻)(要処方)	10mg PTP 20T PTP 100T		1錠中 オキシコドン塩酸 塩水和物 11.54mg (無水物として 10mgに相当)	
オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠 オキシコンチンTR錠 20mg (劇)(麻)(要処方)	20mg PTP 20T PTP 100T		1錠中 オキシコドン塩酸 塩水和物 23.07mg (無水物として 20mgに相当)	
オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠 オキシコンチンTR錠 40mg (劇)(麻)(要処方)	40mg PTP 20T PTP 100T		1錠中 オキシコドン塩酸 塩水和物 46.14mg (無水物として 40mgに相当)	
オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠 オキシコドン徐放錠 5mg 「第一三共」 (劇)(麻)(要処方)	5mg PTP 20T PTP 100T	第一三共	1錠中 オキシコドン塩酸 塩水和物 5.77mg (無水物として 5mgに相当)	1. 焼却する。 2. 乳鉢等で粉末状になるまですりつぶし、熱水を加えて棒状のもので攪拌して懸濁させ、下水に放流する。
オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠 オキシコドン徐放錠 10mg 「第一三共」 (劇)(麻)(要処方)	10mg PTP 20T PTP 100T		1錠中 オキシコドン塩酸 塩水和物 11.54mg (無水物として 10mgに相当)	
オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠 オキシコドン徐放錠 20mg 「第一三共」 (劇)(麻)(要処方)	20mg PTP 20T PTP 100T		1錠中 オキシコドン塩酸 塩水和物 23.07mg (無水物として 20mgに相当)	
オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠 オキシコドン徐放錠 40mg 「第一三共」 (劇)(麻)(要処方)	40mg PTP 20T PTP 100T		1錠中 オキシコドン塩酸 塩水和物 46.14mg (無水物として 40mgに相当)	

内服薬

品 名	包 装	メーカー	組 成	廃 棄 方 法
オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠 オキシコドン徐放錠 5mgNX 「第一三共」 (劇)(麻)(要処方)	5mg PTP 20T PTP 100T	第一三共	1錠中 オキシコドン塩酸 塩水和物 5.77mg (無水物として 5mgに相当)	1. 焼却する。 2. 乳鉢等で粉末状になるまですりつぶし、熱水を加えて棒状のもので攪拌して懸濁させ、下水に放流する。
オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠 オキシコドン徐放錠10mgNX 「第一三共」 (劇)(麻)(要処方)	10mg PTP 20T PTP 100T		1錠中 オキシコドン塩酸 塩水和物 11.54mg (無水物として 10mgに相当)	
オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠 オキシコドン徐放錠20mgNX 「第一三共」 (劇)(麻)(要処方)	20mg PTP 20T PTP 100T		1錠中 オキシコドン塩酸 塩水和物 23.07mg (無水物として 20mgに相当)	
オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠 オキシコドン徐放錠40mgNX 「第一三共」 (劇)(麻)(要処方)	40mg PTP 20T PTP 100T		1錠中 オキシコドン塩酸 塩水和物 46.14mg (無水物として 40mgに相当)	
オキシコドン塩酸塩水和物錠 オキシコドン錠 2.5mg 「第一三共」 (劇)(麻)(要処方)	2.5mg PTP 20T PTP 100T	第一三共	1錠中 オキシコドン塩酸 塩水和物 2.88mg (無水物として 2.5mgに相当)	錠剤を水に溶かして水とともに下水に放流する。
オキシコドン塩酸塩水和物錠 オキシコドン錠 5mg 「第一三共」 (劇)(麻)(要処方)	5mg PTP 20T PTP 100T		1錠中 オキシコドン塩酸 塩水和物 5.77mg (無水物として 5mgに相当)	
オキシコドン塩酸塩水和物錠 オキシコドン錠 10mg 「第一三共」 (劇)(麻)(要処方)	10mg PTP 20T PTP 100T		1錠中 オキシコドン塩酸 塩水和物 11.54mg (無水物として 10mgに相当)	
オキシコドン塩酸塩水和物錠 オキシコドン錠 20mg 「第一三共」 (劇)(麻)(要処方)	20mg PTP 20T PTP 100T		1錠中 オキシコドン塩酸 塩水和物 23.07mg (無水物として 20mgに相当)	

内服薬

品 名	包 装	メーカー	組 成	廃 棄 方 法
オキシコドン塩酸塩水和物錠 オキシコドン錠 2.5mgNX 「第一三共」 (劇)(麻)(要処方)	2.5mg PTP 20T PTP 100T	第一三共	1錠中 オキシコドン塩酸 塩水和物 2.88mg (無水物として 2.5mgに相当)	錠剤を水に溶かして水とともに下水に放流する。
オキシコドン塩酸塩水和物錠 オキシコドン錠 5mgNX 「第一三共」 (劇)(麻)(要処方)	5mg PTP 20T PTP 100T		1錠中 オキシコドン塩酸 塩水和物 5.77mg (無水物として 5mgに相当)	
オキシコドン塩酸塩水和物錠 オキシコドン錠 10mgNX 「第一三共」 (劇)(麻)(要処方)	10mg PTP 20T PTP 100T		1錠中 オキシコドン塩酸 塩水和物 11.54mg (無水物として 10mgに相当)	
オキシコドン塩酸塩水和物錠 オキシコドン錠 20mgNX 「第一三共」 (劇)(麻)(要処方)	20mg PTP 20T PTP 100T		1錠中 オキシコドン塩酸 塩水和物 23.07mg (無水物として 20mgに相当)	
オキシコドン塩酸塩徐放性カプセル オキシコドン徐放カプセル 5mg「テルモ」 (劇)(麻)(要処方)	5mg PTP 40cap PTP 100cap	帝 国	1カプセル中 オキシコドン塩酸 塩水和物 5.77mg (無水物として 5mgに相当)	カプセル剤を水中に入れ、5分程（目安）放置し崩壊させた後、内容物の顆粒の放出が認められたならば、乳鉢ですり潰して、水とともに下水に放流する。
オキシコドン塩酸塩徐放性カプセル オキシコドン徐放カプセル 10mg「テルモ」 (劇)(麻)(要処方)	10mg PTP 40cap PTP 100cap		1カプセル中 オキシコドン塩酸 塩水和物 11.54mg (無水物として 10mgに相当)	
オキシコドン塩酸塩徐放性カプセル オキシコドン徐放カプセル 20mg「テルモ」 (劇)(麻)(要処方)	20mg PTP 40cap PTP 100cap		1カプセル中 オキシコドン塩酸 塩水和物 23.07mg (無水物として 20mgに相当)	
オキシコドン塩酸塩徐放性カプセル オキシコドン徐放カプセル 40mg「テルモ」 (劇)(麻)(要処方)	40mg PTP 40cap PTP 100cap		1カプセル中 オキシコドン塩酸 塩水和物 46.14mg (無水物として 40mgに相当)	

内服薬

品 名	包 装	メーカー	組 成	廃 棄 方 法
がん疼痛治療用即放性分包内服液 オキシコドン内服液 2.5mg 「日本臓器」 (劇)(麻)(要処方)	2.5mg×20包	日本臓器	1 包2.5mL中 オキシコドン塩酸 塩水和物 2.88mg (無水物として 2.5mgに相当)	水とともに下水に放流する。
がん疼痛治療用即放性分包内服液 オキシコドン内服液 5mg 「日本臓器」 (劇)(麻)(要処方)	5mg×20包		1 包2.5mL中 オキシコドン塩酸 塩水和物 5.77mg (無水物として 5mgに相当)	
がん疼痛治療用即放性分包内服液 オキシコドン内服液 10mg 「日本臓器」 (劇)(麻)(要処方)	10mg×20包		1 包5mL中 オキシコドン塩酸 塩水和物 11.54mg (無水物として 10mgに相当)	
がん疼痛治療用即放性分包内服液 オキシコドン内服液 20mg 「日本臓器」 (劇)(麻)(要処方)	20mg×20包		1 包5mL中 オキシコドン塩酸 塩水和物 23.07mg (無水物として 20mgに相当)	
オキシメテバノール錠 メテバニール錠 2mg (劇)(麻)(要処方)	PTP 100T 100T	第一三共	1錠中 オキシメテバ ノール 2mg	粉砕して水とともに下水に放流する。
ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠 ナルサス錠 2mg (劇)(麻)(要処方)	2mg PTP 20T PTP 100T	第一三共	1錠中 ヒドロモルフォン 塩酸塩 2.3mg (ヒドロモルフォン として2mg)	1. 焼却する。 2. 乳鉢等で粉末状になるまですりつぶし、熱水を加えて棒状のもので攪拌して懸濁させ、下水に放流する。
ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠 ナルサス錠 6mg (劇)(麻)(要処方)	6mg PTP 20T PTP 100T		1錠中 ヒドロモルフォン 塩酸塩 6.8mg (ヒドロモルフォン として6mg)	
ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠 ナルサス錠 12mg (劇)(麻)(要処方)	12mg PTP 20T PTP 100T		1錠中 ヒドロモルフォン 塩酸塩 13.5mg (ヒドロモルフォン として12mg)	
ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠 ナルサス錠 24mg (劇)(麻)(要処方)	24mg PTP 20T PTP 100T		1錠中 ヒドロモルフォン 塩酸塩 27.1mg (ヒドロモルフォン として24mg)	

内服薬

品 名	包 装	メーカー	組 成	廃 棄 方 法
ヒドロモルフォン塩酸塩錠 ナ ル ラ ピ ド 錠 1mg (劇) (麻) (要処方)	1mg PTP 20T PTP 100T	第一三共	1錠中 ヒドロモルフォン 塩酸塩 1.1mg (ヒドロモルフォン として1mg)	錠剤を水に溶かして水とともに下水に放流する。
ヒドロモルフォン塩酸塩錠 ナ ル ラ ピ ド 錠 2mg (劇) (麻) (要処方)	2mg PTP 20T PTP 100T		1錠中 ヒドロモルフォン 塩酸塩 2.3mg (ヒドロモルフォン として2mg)	
ヒドロモルフォン塩酸塩錠 ナ ル ラ ピ ド 錠 4mg (劇) (麻) (要処方)	4mg PTP 20T PTP 100T		1錠中 ヒドロモルフォン 塩酸塩 4.5mg (ヒドロモルフォン として4mg)	
日本薬局方 ペ チ ジ ン 塩 酸 塩 (塩酸ペチジン) (麻) (要処方)	1g	田辺三菱 製薬工場 (オビスタン原末)	ペチジン塩酸塩	水とともに下水に放流する。
フェンタニルクエン酸塩 口腔粘膜吸収製剤 イーフェンバツカル錠50μg (劇) (麻) (要処方)	50μg 20T	帝 国	1 錠中 フェンタニルク エン酸塩 78.55μg (フェンタニル として50μg)	水で錠剤を溶解させた後、下水に放流する。 なお、廃棄する際には粉碎などの処理は行わない こと。 ※イーフェンバツカル錠は、発泡しながら溶解す る。
フェンタニルクエン酸塩 口腔粘膜吸収製剤 イーフェンバツカル錠100μg (劇) (麻) (要処方)	100μg 20T		1 錠中 フェンタニルク エン酸塩 157.1μg (フェンタニル として100μg)	
フェンタニルクエン酸塩 口腔粘膜吸収製剤 イーフェンバツカル錠200μg (劇) (麻) (要処方)	200μg 20T		1 錠中 フェンタニルク エン酸塩 314.2μg (フェンタニル として200μg)	
フェンタニルクエン酸塩 口腔粘膜吸収製剤 イーフェンバツカル錠400μg (劇) (麻) (要処方)	400μg 20T		1 錠中 フェンタニルク エン酸塩 628.4μg (フェンタニル として400μg)	
フェンタニルクエン酸塩 口腔粘膜吸収製剤 イーフェンバツカル錠600μg (劇) (麻) (要処方)	600μg 20T		1 錠中 フェンタニルク エン酸塩 942.7μg (フェンタニル として600μg)	
フェンタニルクエン酸塩 口腔粘膜吸収製剤 イーフェンバツカル錠800μg (劇) (麻) (要処方)	800μg 20T		1 錠中 フェンタニルク エン酸塩 1256.9μg (フェンタニル として800μg)	

内服薬

品 名	包 装	メーカー	組 成	廃 棄 方 法
フェンタニルクエン酸塩舌下錠 アブストラル舌下錠100μg (劇) (麻) (要処方)	100 μ g $\times$ 40T	協和キリン	1錠中 フェンタニルク エン酸塩 157.1 μ g (フェンタニル として100 μ g)	水に溶解後、下水に放流する。
フェンタニルクエン酸塩舌下錠 アブストラル舌下錠200μg (劇) (麻) (要処方)	200 μ g $\times$ 40T		1錠中 フェンタニルク エン酸塩 314.2 μ g (フェンタニル として200 μ g)	
フェンタニルクエン酸塩舌下錠 アブストラル舌下錠400μg (劇) (麻) (要処方)	400 μ g $\times$ 40T		1錠中 フェンタニルク エン酸塩 628.4 μ g (フェンタニル として400 μ g)	
メサドン塩酸塩錠 メサペイン錠 5mg (劇) (麻) (要処方)	5mg PTP 40T PTP 100T	帝 國	1錠中 メサドン塩酸塩 5mg	水で錠剤を溶解・崩壊させたのち下水に放流する。
メサドン塩酸塩錠 メサペイン錠 10mg (劇) (麻) (要処方)	10mg PTP 40T PTP 100T		1錠中 メサドン塩酸塩 10mg	
持続性癌疼痛治療剤 タペンタ錠 25mg (劇) (麻) (要処方)	25mg PTP 40T	ヤンセン ファーマ	1錠中 タペンタドール塩 酸塩 29.12mg (タペンタドールとして 25mg)含有	本剤の医療機関等における廃棄に当たっては、下 記の事項を参考にして、①又は②の方法で確実に 廃棄してください。 ① 錠剤を焼却してください。 ② 粘着力の強いガムテープなどで錠剤を包み、錠 剤が見えない状態にして、通常の医薬品と同様 に廃棄してください。 [注意] ■ TRF製剤(改変防止製剤)のため、水性溶媒中 (水、エタノール、酸性水溶液など)では粘性ゲ ルとなり、溶解による廃棄は困難です。 ■ 破砕は困難なため、ミキサーを使用した廃棄は 行わないでください(刃を傷めることがあります)。
持続性癌疼痛治療剤 タペンタ錠 50mg (劇) (麻) (要処方)	50mg PTP 40T		1錠中 タペンタドール塩 酸塩 58.24mg (タペンタドールとして 50mg)含有	
持続性癌疼痛治療剤 タペンタ錠 100mg (劇) (麻) (要処方)	100mg PTP 40T		1錠中 タペンタドール塩 酸塩 116.48mg (タペンタドールとして 100mg)含有	

注 射 薬

品 名	包 装	メーカー	組 成	廃 棄 方 法
日本薬局方 アヘンアルカロイド塩酸塩注射液 (オピアル注射液) 劇麻要処方	1mL×10A	武 田 (バンオピン皮下注20mg) 田辺三菱 製薬工場	1mL中 アヘンアルカロ イド塩酸塩 20mg	アンプルをカットして注射液を下水に放流する。
日本薬局方 アヘンアルカロイド・ アトロピン注射液 (オピアト注射液) 劇麻要処方	1mL×10A	武 田 (バンアト注) 田辺三菱 製薬工場	1mL中 アヘンアルカロ イド塩酸塩 20mg アトロピン硫酸 塩水和物 0.3mg	アンプルをカットして注射液を下水に放流する。
日本薬局方 弱アヘンアルカロイド・ スコポラミン注射液 (弱オピスコ注射液) 劇麻要処方	1mL×10A	武 田 (弱バンスコ注) 田辺三菱 製薬工場	1mL中 アヘンアルカロ イド塩酸塩 20mg スコポラミン臭化 水素酸塩水和物 0.3mg	アンプルをカットして注射液を下水に放流する。
日本薬局方 アヘンアルカロイド・ スコポラミン注射液 (オピスコ注射液) 劇麻要処方	1mL×10A	武 田 (バンスコ注) 田辺三菱 製薬工場	1mL中 アヘンアルカロ イド塩酸塩 40mg スコポラミン臭化 水素酸塩水和物 0.6mg	アンプルをカットして注射液を下水に放流する。
日本薬局方 モルヒネ塩酸塩注射液10mg (塩酸モルヒネ注射液 10mg) 劇麻要処方	1mL×10A	第一三共 シオノギ ファーマ 住友ファーマ (アンベック注10mg) (〃 50mg)	1mL中 モルヒネ塩酸塩 水和物 10mg	アンプルをカットして注射液を下水に放流する。
日本薬局方 モルヒネ塩酸塩注射液50mg (塩酸モルヒネ注射液 50mg) 劇麻要処方	5mL×5A	武 田 田辺三菱 製薬工場	5mL中 モルヒネ塩酸塩 水和物 50mg	
	5mL×10A	武 田		
日本薬局方 モルヒネ塩酸塩注射液200mg (塩酸モルヒネ注射液 200mg) 劇麻要処方	5mL×1A	シオノギ ファーマ 田辺三菱 製薬工場	5mL中 モルヒネ塩酸塩 水和物 200mg	
	5mL×5A	第一三共 シオノギ ファーマ 住友ファーマ (アンベック注200mg) 武 田 田辺三菱 製薬工場 テルモ		
	5mL×10A	田辺三菱 製薬工場		

注 射 薬

品 名	包 装	メーカー	組 成	廃 棄 方 法
モルヒネ塩酸塩注射液 プレペノン注50mgシリンジ (劇) (麻) (要処方)	5mL×5本	テルモ	5mL中 モルヒネ塩酸塩水和物 50mg	プランジャー(押し子)を完全に押し切って、シリンジ内の残液を下水に放流する。
モルヒネ塩酸塩注射液 プレペノン注100mgシリンジ (劇) (麻) (要処方)	10mL×5本		10mL中 モルヒネ塩酸塩水和物 100mg	
モルヒネ塩酸塩注射液 モルヒネ塩酸塩注100mgシリンジ「テルモ」 (劇) (麻) (要処方)	10mL×5本	テルモ	10mL中 モルヒネ塩酸塩水和物 100mg	プランジャー(押し子)を完全に押し切って、シリンジ内の残液を下水に放流する。
日本薬局方 モルヒネ・アトロピン注射液 (モヒアト注射液) (劇) (麻) (要処方)	1mL×10A	武 田 田辺三菱製薬工場	1mL中 モルヒネ塩酸塩水和物 10mg アトロピン硫酸塩水和物 0.3mg	アンブルをカットして注射液を下水に放流する。
日本薬局方 複方オキシコドン注射液 (複方ヒコデノン注射液) (劇) (麻) (要処方)	1mL×10A	武 田 (パビナール注)	1mL中 オキシコドン塩酸塩水和物 8mg ヒドロコタルニン塩酸塩水和物 2mg	アンブルをカットして注射液を下水に放流する。
日本薬局方 複方オキシコドン・アトロピン注射液 (ヒコアト注射液) (劇) (麻) (要処方)	1mL×10A	武 田 (パビナール・アトロピン注)	1mL中 オキシコドン塩酸塩水和物 8mg ヒドロコタルニン塩酸塩水和物 2mg アトロピン硫酸塩水和物 0.3mg	アンブルをカットして注射液を下水に放流する。
オキシコドン塩酸塩水和物注射液 オキファスト注 10mg (劇) (麻) (要処方)	1mL×10A	シオノギファーマ	1mL中 オキシコドン塩酸塩水和物 11.54mg (無水物として 10mgに相当)	アンブルをカットして注射液を下水に放流する。
オキシコドン塩酸塩水和物注射液 オキファスト注 50mg (劇) (麻) (要処方)	5mL×5A		1mL中 オキシコドン塩酸塩水和物 57.68mg (無水物として 50mgに相当)	
オキシコドン塩酸塩水和物注射液 オキシコドン注射液10mg「第一三共」 (劇) (麻) (要処方)	1mL×10A	第一三共	1mL中 オキシコドン塩酸塩水和物 11.54mg (無水物として 10mgに相当)	アンブルをカットして注射液を下水に放流する。
オキシコドン塩酸塩水和物注射液 オキシコドン注射液50mg「第一三共」 (劇) (麻) (要処方)	5mL×5A		5mL中 オキシコドン塩酸塩水和物 57.68mg (無水物として 50mgに相当)	

注 射 薬

品 名	包 装	メーカー	組 成	廃 棄 方 法
ヒドロモルフォン塩酸塩注 ナルベイン 注 2mg (劇) (麻) (要処方)	1mL×10A	第一三共	1mL中 ヒドロモルフォン 塩酸塩 2.3mg (ヒドロモルフォン として2mg)	アンプルをカットして注射液を下水に放流する。
ヒドロモルフォン塩酸塩注 ナルベイン 注 20mg (劇) (麻) (要処方)	2mL×10A		2mL中 ヒドロモルフォン 塩酸塩 22.6mg (ヒドロモルフォン として20mg)	
日本薬局方 ペチジン塩酸塩注射液 (塩酸ペチジン注射液) (麻) (要処方)	35mg 1mL×10A ----- 50mg 1mL×10A	武 田 田辺三菱 製薬工場 (オピスタン 注射液)	1mL中 ペチジン塩酸塩 35mg ----- 1mL中 ペチジン塩酸塩 50mg	アンプルをカットして注射液を下水に放流する。
ペチロルファン配合注LD (麻) (要処方)	1mL×10A	武 田	1mL中 ペチジン塩酸塩 35mg レバロルファン 酒石酸塩 0.4375mg	アンプルをカットして注射液を下水に放流する。
弱ペチロルファン注射液 (麻) (要処方)	1mL×10A	武 田	1mL中 ペチジン塩酸塩 35mg レバロルファン 酒石酸塩 0.4375mg	アンプルをカットして注射液を下水に放流する。
ペチロルファン配合注HD (麻) (要処方)	1mL×10A	武 田	1mL中 ペチジン塩酸塩 50mg レバロルファン 酒石酸塩 0.625mg	アンプルをカットして注射液を下水に放流する。
ペチロルファン注射液 (麻) (要処方)	1mL×10A	武 田	1mL中 ペチジン塩酸塩 50mg レバロルファン 酒石酸塩 0.625mg	アンプルをカットして注射液を下水に放流する。
麻酔用鎮痛剤 フェンタニル注射液0.1mg 「第一三共」 (劇) (麻) (要処方)	2mL×10A	第一三共	2mL中 フェンタニルクエ ン酸塩 0.157mg (フェンタニルと して0.1mg)	アンプルをカットして注射液を下水に放流する。
麻酔用鎮痛剤 フェンタニル注射液0.25mg 「第一三共」 (劇) (麻) (要処方)	5mL×5A		5mL中 フェンタニルクエ ン酸塩 0.3925mg (フェンタニルと して0.25mg)	

注 射 薬

品 名	包 装	メーカー	組 成	廃 棄 方 法
麻酔用鎮痛剤 フェンタニル注射液0.1mg 「ヤンセン」 (劇)(麻)(要処方)	2mL×10A	ヤンセン ファーマ	2mL中 フェンタニルクエン酸塩 0.157mg (フェンタニルとして0.1mg)	アンプルをカットして注射液を下水に放流する。
麻酔用鎮痛剤 フェンタニル注射液0.25mg 「ヤンセン」 (劇)(麻)(要処方)	5mL×5A		5mL中 フェンタニルクエン酸塩 0.3925mg (フェンタニルとして0.25mg)	
麻酔用鎮痛剤 フェンタニル注射液0.5mg 「ヤンセン」 (劇)(麻)(要処方)	10mL×5A		10mL中 フェンタニルクエン酸塩 0.785mg (フェンタニルとして0.5mg)	
麻酔用鎮痛剤 フェンタニル注射液0.1mg 「テルモ」 (劇)(麻)(要処方)	2mL×10A	テルモ	2mL中 フェンタニルクエン酸塩 0.157mg (フェンタニルとして0.1mg)	アンプルをカットして注射液を下水に放流する。
麻酔用鎮痛剤 フェンタニル注射液0.25mg 「テルモ」 (劇)(麻)(要処方)	5mL×5A		5mL中 フェンタニルクエン酸塩 0.3925mg (フェンタニルとして0.25mg)	
麻酔用鎮痛剤 フェンタニル注射液0.5mg 「テルモ」 (劇)(麻)(要処方)	10mL×5A		10mL中 フェンタニルクエン酸塩 0.785mg (フェンタニルとして0.5mg)	
ノイロレプトアナルゲシア用麻酔剤 タラモナル静注 (劇)(麻)(要処方)	2mL×10A	第一三共	1mL 中 フェンタニルクエン酸塩 0.0785mg (フェンタニルとして0.05mg) ドロペリドール 2.5mg	アンプルをカットして注射液を下水に放流する。
全身麻酔用鎮痛剤 アルチバ静注用 2mg (劇)(麻)(要処方)	2mg×5V	ヤンセン ファーマ	1バイアル中 レミフェンタニル塩酸塩 2.2mg (レミフェンタニルとして2mg)	・ バイアル内に残った注射液は注射針で抜き取り、下水へ放流する。 ・ 施用器具（シリンジなど）内に残った注射液は、下水に放流する。
全身麻酔用鎮痛剤 アルチバ静注用 5mg (劇)(麻)(要処方)	5mg×5V		1バイアル中 レミフェンタニル塩酸塩 5.5mg (レミフェンタニルとして5mg)	

注 射 薬

品 名	包 装	メーカー	組 成	廃 棄 方 法
全身麻酔用・集中治療用鎮痛剤 レミフェンタニル静注用2mg 「第一三共」 劇麻要処方	2mg×5V	丸 石	1バイアル中 レミフェンタニル 塩酸塩 2.2mg (レミフェンタニル として2mg)	- バイアル内に残った注射液は注射針で抜き取り、下水へ放流する。 - 施用器具（シリンジなど）内に残った注射液は、下水に放流する。
全身麻酔用・集中治療用鎮痛剤 レミフェンタニル静注用5mg 「第一三共」 劇麻要処方	5mg×5V		1バイアル中 レミフェンタニル 塩酸塩 5.5mg (レミフェンタニル として5mg)	
注射用全身麻酔剤 ケタラル 静注用 50mg 劇麻要処方	5mL×5A	第一三共	1 アンプル中 ケタミン塩酸塩 57.7mg/5mL (ケタミンとして 50mg/5mL)	アンプルをカットして注射液を下水に放流する。 - バイアル内に残った注射液は注射針で抜き取り、下水へ放流する。 - 施用器具（シリンジなど）内に残った注射液は、下水に放流する。
注射用全身麻酔剤 ケタラル 静注用 200mg 劇麻要処方	20mL×1V 20mL×10V		1 バイアル中 ケタミン塩酸塩 230.7mg/20mL (ケタミンとして 200mg/20mL)	
注射用全身麻酔剤 ケタラル 筋注用 500mg 劇麻要処方	10mL×1V 10mL×10V		1 バイアル中 ケタミン塩酸塩 576.7mg/10mL (ケタミンとして 500mg/10mL)	

外用薬

品 名	包 装	メーカー	組 成	廃 棄 方 法
モルヒネ塩酸塩坐剤 アンペック坐剤 10mg 劇 麻 要処方	10mg 50個	住友ファーマ	1個中 モルヒネ塩酸塩 水和物 10mg	目安：アンペック坐剤1個＋温水量100mL以上＋ 家庭用液体台所洗剤1mL/温水100mL 実例：アンペック坐剤20mg5個を50～60℃の温水 約500mLに入れ、これに家庭用液体台所洗 剤約3mLを加えて、十分かき混ぜると坐剤 は乳化状態になり、流しに廃棄することが できる。
モルヒネ塩酸塩坐剤 アンペック坐剤 20mg 劇 麻 要処方	20mg 50個		1個中 モルヒネ塩酸塩 水和物 20mg	
モルヒネ塩酸塩坐剤 アンペック坐剤 30mg 劇 麻 要処方	30mg 30個		1個中 モルヒネ塩酸塩 水和物 30mg	
日本薬局方 コカイン塩酸塩 (塩酸コカイン) 劇 麻 要処方	5g	シオノギ ファーマ 武 田	コカイン塩酸塩	水とともに下水に放流する。
経皮吸収型 持続性疼痛治療剤 デュロテップMTパッチ2.1mg 劇 麻 要処方	2.1mg×5枚	ヤンセン ファーマ	1枚中 フェンタニル 2.1mg	①未使用製剤の廃棄 (ライナーから剥がすのに失敗した場合等を含む) ・パッチを焼却して下さい。 ・焼却できない場合は、ライナーを剥がし、粘 着面を内側に二つ折りにした後、ハサミなど を用いて細断し、通常の医薬品と同様に廃棄 する。 ＊シュレッダーを使用した廃棄は、行わない。 ＊院外施用の場合は病院・薬局へ返却するよう 患者さん等に指導する。 なお、返却された場合は上記方法により廃棄 する。 ②使用済み製剤の廃棄 (施用途中で剥離した場合や途中で施用を中止 した場合も含む) ・パッチの粘着面を内側にして貼り合せた後、 通常の医薬品と同様に廃棄する。 ＊シュレッダーを使用した廃棄は、行わない。
経皮吸収型 持続性疼痛治療剤 デュロテップMTパッチ4.2mg 劇 麻 要処方	4.2mg×5枚		1枚中 フェンタニル 4.2mg	
経皮吸収型 持続性疼痛治療剤 デュロテップMTパッチ8.4mg 劇 麻 要処方	8.4mg×5枚		1枚中 フェンタニル 8.4mg	
経皮吸収型 持続性疼痛治療剤 デュロテップMTパッチ12.6mg 劇 麻 要処方	12.6mg×5枚		1枚中 フェンタニル 12.6mg	
経皮吸収型 持続性疼痛治療剤 デュロテップMTパッチ16.8mg 劇 麻 要処方	16.8mg×5枚		1枚中 フェンタニル 16.8mg	

外用薬

品 名	包 装	メーカー	組 成	廃 棄 方 法
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル3日用テープ 2.1mg「HMT」 (劇)(麻)(要処方)	2.1mg×5枚	久 光	1 枚中 フェンタニル 2.1mg	①未使用製剤の廃棄 (ライナーから剥がすのに失敗した場合等を含む) ・テープを焼却して下さい。 ・焼却できない場合は、ライナーを剥がし、粘着面を内側に二つ折りにした後、ハサミなどを用いて細断し、通常の医薬品と同様に廃棄する。 ＊シュレッダーを使用した廃棄は、行わない。 ＊院外施用の場合は病院・薬局へ返却するよう患者さん等に指導する。 なお、返却された場合は上記方法により廃棄する。 ②使用済み製剤の廃棄 (施用途中で剥離した場合、途中で施用を中止した場合、貼付直後、上手く貼付できず剥がれた場合も含む) ・テープの粘着面を内側にして貼り合わせた後、通常の医薬品と同様に廃棄する。 ＊シュレッダーを使用した廃棄は、行わない。
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル3日用テープ 4.2mg「HMT」 (劇)(麻)(要処方)	4.2mg×5枚		1 枚中 フェンタニル 4.2mg	
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル3日用テープ 8.4mg「HMT」 (劇)(麻)(要処方)	8.4mg×5枚		1 枚中 フェンタニル 8.4mg	
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル3日用テープ 12.6mg「HMT」 (劇)(麻)(要処方)	12.6mg×5枚		1 枚中 フェンタニル 12.6mg	
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル3日用テープ 16.8mg「HMT」 (劇)(麻)(要処方)	16.8mg×5枚		1 枚中 フェンタニル 16.8mg	
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル3日用テープ 2.1mg「明治」 (劇)(麻)(要処方)	2.1mg×5枚	祐 徳	1 枚中 フェンタニル 2.1mg	①未使用製剤の廃棄 (ライナーから剥がすのに失敗した場合等を含む) ・テープを焼却して下さい。 ・焼却できない場合は、ライナーを剥がし、粘着面を内側に二つ折りにした後、ハサミなどを用いて細断し、通常の医薬品と同様に廃棄する。 ＊シュレッダーを使用した廃棄は、行わない。 ＊院外施用の場合は病院・薬局へ返却するよう患者さん等に指導する。 なお、返却された場合は上記方法により廃棄する。 ②使用済み製剤の廃棄 (施用途中で剥離した場合や途中で施用を中止した場合も含む) ・テープの粘着面を内側にして貼り合わせた後、通常の医薬品と同様に廃棄する。 ＊シュレッダーを使用した廃棄は、行わない。
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル3日用テープ 4.2mg「明治」 (劇)(麻)(要処方)	4.2mg×5枚		1 枚中 フェンタニル 4.2mg	
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル3日用テープ 8.4mg「明治」 (劇)(麻)(要処方)	8.4mg×5枚		1 枚中 フェンタニル 8.4mg	
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル3日用テープ 12.6mg「明治」 (劇)(麻)(要処方)	12.6mg×5枚		1 枚中 フェンタニル 12.6mg	
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル3日用テープ 16.8mg「明治」 (劇)(麻)(要処方)	16.8mg×5枚		1 枚中 フェンタニル 16.8mg	

外用薬

品 名	包 装	メーカー	組 成	廃 棄 方 法
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル3日用テープ 2.1mg「ユートク」 （劇）（麻）（要処方）	2.1mg×5枚	祐 徳	1 枚中 フェンタニル 2.1mg	①未使用製剤の廃棄 （ライナーから剥がすのに失敗した場合等を含む） ・テープを焼却して下さい。 ・焼却できない場合は、ライナーを剥がし、粘着面を内側に二つ折りにした後、ハサミなどを用いて細断し、通常の医薬品と同様に廃棄する。 ＊シュレッダーを使用した廃棄は、行わない。 ＊院外施用の場合は病院・薬局へ返却するよう患者さん等に指導する。 なお、返却された場合は上記方法により廃棄する。
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル3日用テープ 4.2mg「ユートク」 （劇）（麻）（要処方）	4.2mg×5枚		1 枚中 フェンタニル 4.2mg	
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル3日用テープ 8.4mg「ユートク」 （劇）（麻）（要処方）	8.4mg×5枚		1 枚中 フェンタニル 8.4mg	
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル3日用テープ 12.6mg「ユートク」 （劇）（麻）（要処方）	12.6mg×5枚		1 枚中 フェンタニル 12.6mg	
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル3日用テープ 16.8mg「ユートク」 （劇）（麻）（要処方）	16.8mg×5枚		1 枚中 フェンタニル 16.8mg	
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル3日用テープ 2.1mg「テルモ」 （劇）（麻）（要処方）	2.1mg×5枚	帝 國	1 枚中 フェンタニル 2.1mg	①未使用製剤の廃棄 （ライナーから剥がすのに失敗した場合等を含む） ・テープを焼却して下さい。 ・焼却できない場合は、ライナーを剥がし、粘着面を内側に二つ折りにした後、ハサミなどを用いて細断し、通常の医薬品と同様に廃棄する。 ＊シュレッダーを使用した廃棄は、行わない。 ＊院外施用の場合は病院・薬局へ返却するよう患者さん等に指導する。 なお、返却された場合は上記方法により廃棄する。
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル3日用テープ 4.2mg「テルモ」 （劇）（麻）（要処方）	4.2mg×5枚		1 枚中 フェンタニル 4.2mg	
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル3日用テープ 8.4mg「テルモ」 （劇）（麻）（要処方）	8.4mg×5枚		1 枚中 フェンタニル 8.4mg	
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル3日用テープ 12.6mg「テルモ」 （劇）（麻）（要処方）	12.6mg×5枚		1 枚中 フェンタニル 12.6mg	
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル3日用テープ 16.8mg「テルモ」 （劇）（麻）（要処方）	16.8mg×5枚		1 枚中 フェンタニル 16.8mg	

外用薬

品 名	包 装	メーカー	組 成	廃 棄 方 法
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル3日用テープ 2.1mg「テイコク」 (劇)(麻)(要処方)	2.1mg×5枚	帝 國	1 枚中 フェンタニル 2.1mg	①未使用製剤の廃棄 (ライナーから剥がすのに失敗した場合等を含む) ・テープを焼却して下さい。 ・焼却できない場合は、ライナーを剥がし、粘着面を内側に二つ折りにした後、ハサミなどを用いて細断し、通常の医薬品と同様に廃棄する。 ＊シュレッダーを使用した廃棄は、行わない。 ＊院外施用の場合は病院・薬局へ返却するよう患者さん等に指導する。 なお、返却された場合は上記方法により廃棄する。 ②使用済み製剤の廃棄 (施用途中で剥離した場合や途中で施用を中止した場合も含む) ・テープの粘着面を内側にして貼り合わせた後、通常の医薬品と同様に廃棄する。 ＊シュレッダーを使用した廃棄は、行わない。
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル3日用テープ 4.2mg「テイコク」 (劇)(麻)(要処方)	4.2mg×5枚		1 枚中 フェンタニル 4.2mg	
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル3日用テープ 8.4mg「テイコク」 (劇)(麻)(要処方)	8.4mg×5枚		1 枚中 フェンタニル 8.4mg	
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル3日用テープ 12.6mg「テイコク」 (劇)(麻)(要処方)	12.6mg×5枚		1 枚中 フェンタニル 12.6mg	
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル3日用テープ 16.8mg「テイコク」 (劇)(麻)(要処方)	16.8mg×5枚		1 枚中 フェンタニル 16.8mg	
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル3日用テープ 2.1mg「トーフ」 (劇)(麻)(要処方)	2.1mg×5枚	東 和	1 枚中 フェンタニル 2.1mg	①未使用製剤の廃棄 (ライナーから剥がすのに失敗した場合等を含む) ・テープを焼却して下さい。 ・焼却できない場合は、ライナーを剥がし、粘着面を内側に二つ折りにした後、ハサミなどを用いて細断し、通常の医薬品と同様に廃棄する。 ＊シュレッダーを使用した廃棄は、行わない。 ＊院外施用の場合は病院・薬局へ返却するよう患者さん等に指導する。 なお、返却された場合は上記方法により廃棄する。 ②使用済み製剤の廃棄 (施用途中で剥離した場合や途中で施用を中止した場合も含む) ・テープの粘着面を内側にして貼り合わせた後、通常の医薬品と同様に廃棄する。 ＊シュレッダーを使用した廃棄は、行わない。
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル3日用テープ 4.2mg「トーフ」 (劇)(麻)(要処方)	4.2mg×5枚		1 枚中 フェンタニル 4.2mg	
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル3日用テープ 8.4mg「トーフ」 (劇)(麻)(要処方)	8.4mg×5枚		1 枚中 フェンタニル 8.4mg	
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル3日用テープ 12.6mg「トーフ」 (劇)(麻)(要処方)	12.6mg×5枚		1 枚中 フェンタニル 12.6mg	
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル3日用テープ 16.8mg「トーフ」 (劇)(麻)(要処方)	16.8mg×5枚		1 枚中 フェンタニル 16.8mg	

外用薬

品 名	包 装	メーカー	組 成	廃 棄 方 法
経皮吸収型 持続性がん疼痛治療剤 ラフェンタテープ 1.38mg (劇)(麻)(要処方)	1.38mg×5枚	日本臓器	1 枚中 フェンタニル 1.38mg	①未使用製剤の廃棄 (ライナーから剥がすのに失敗した場合等を含む) ・テープを焼却して下さい。 ・焼却できない場合は、ライナーを剥がし、粘着面を内側に二つ折りにした後、ハサミなどを用いて細断し、通常の医薬品と同様に廃棄する。 ＊シュレッダーを使用した廃棄は、行わない。 ＊院外施用の場合は病院・薬局へ返却するよう患者さん等に指導する。 なお、返却された場合は上記方法により廃棄する。 ②使用済み製剤の廃棄 (施用途中で剥離した場合や途中で施用を中止した場合も含む) ・テープの粘着面を内側にして貼り合せた後、通常の医薬品と同様に廃棄する。 ＊シュレッダーを使用した廃棄は、行わない。
経皮吸収型 持続性がん疼痛治療剤 ラフェンタテープ 2.75mg (劇)(麻)(要処方)	2.75mg×5枚		1 枚中 フェンタニル 2.75mg	
経皮吸収型 持続性がん疼痛治療剤 ラフェンタテープ 5.5mg (劇)(麻)(要処方)	5.5mg×5枚		1 枚中 フェンタニル 5.5mg	
経皮吸収型 持続性がん疼痛治療剤 ラフェンタテープ 8.25mg (劇)(麻)(要処方)	8.25mg×5枚		1 枚中 フェンタニル 8.25mg	
経皮吸収型 持続性がん疼痛治療剤 ラフェンタテープ 11mg (劇)(麻)(要処方)	11mg×5枚		1 枚中 フェンタニル 11mg	
経皮吸収型 持続性疼痛治療剤 フェントステープ 0.5mg (劇)(麻)(要処方)	0.5mg×7枚	久 光	1 枚中 フェンタニルクエン酸塩 0.5mg (フェンタニルとして 0.32mg)	①未使用製剤の廃棄 (ライナーから剥がすのに失敗した場合等を含む) ・テープを焼却して下さい。 ・焼却できない場合は、ライナーを剥がし、粘着面を内側に二つ折りにした後、ハサミなどを用いて細断し、通常の医薬品と同様に廃棄する。 ＊シュレッダーを使用した廃棄は、行わない。 ＊院外施用の場合は病院・薬局へ返却するよう患者さん等に指導する。 なお、返却された場合は上記方法により廃棄する。 ②使用済み製剤の廃棄 (施用途中で剥離した場合、途中で施用を中止した場合、貼付直後、上手く貼付できず剥がれた場合も含む) ・テープの粘着面を内側にして貼り合わせた後、通常の医薬品と同様に廃棄する。 ＊シュレッダーを使用した廃棄は、行わない。
経皮吸収型 持続性疼痛治療剤 フェントステープ 1mg (劇)(麻)(要処方)	1mg×7枚		1 枚中 フェンタニルクエン酸塩 1mg (フェンタニルとして 0.64mg)	
経皮吸収型 持続性疼痛治療剤 フェントステープ 2mg (劇)(麻)(要処方)	2mg×7枚		1 枚中 フェンタニルクエン酸塩 2mg (フェンタニルとして 1.27mg)	
経皮吸収型 持続性疼痛治療剤 フェントステープ 4mg (劇)(麻)(要処方)	4mg×7枚		1 枚中 フェンタニルクエン酸塩 4mg (フェンタニルとして 2.55mg)	
経皮吸収型 持続性疼痛治療剤 フェントステープ 6mg (劇)(麻)(要処方)	6mg×7枚		1 枚中 フェンタニルクエン酸塩 6mg (フェンタニルとして 3.82mg)	
経皮吸収型 持続性疼痛治療剤 フェントステープ 8mg (劇)(麻)(要処方)	8mg×7枚		1 枚中 フェンタニルクエン酸塩 8mg (フェンタニルとして 5.09mg)	

外用薬

品 名	包 装	メーカー	組 成	廃 棄 方 法
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ1mg「第一三共」 (劇)(麻)(要処方)	1mg×7枚	救 急	1 枚中 フェンタニルクエン酸塩 1mg (フェンタニルとして 0.64mg)	①未使用製剤の廃棄 (ライナーから剥がすのに失敗した場合等を含む) ・テープを焼却して下さい。 ・焼却できない場合は、ライナーを剥がし、粘着面を内側に二つ折りにした後、ハサミなどを用いて細断し、通常の医薬品と同様に廃棄する。 ＊シュレッダーを使用した廃棄は、行わない。 ＊院外施用の場合は病院・薬局へ返却するよう患者さん等に指導する。 なお、返却された場合は上記方法により廃棄する。 ②使用済み製剤の廃棄 (施用途中で剥離した場合、途中で施用を中止した場合、貼付直後、上手く貼付できず剥がれた場合も含む) ・テープの粘着面を内側にして貼り合わせた後、通常の医薬品と同様に廃棄する。 ＊シュレッダーを使用した廃棄は、行わない。
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ2mg「第一三共」 (劇)(麻)(要処方)	2mg×7枚		1 枚中 フェンタニルクエン酸塩 2mg (フェンタニルとして 1.27mg)	
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ4mg「第一三共」 (劇)(麻)(要処方)	4mg×7枚		1 枚中 フェンタニルクエン酸塩 4mg (フェンタニルとして 2.55mg)	
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ6mg「第一三共」 (劇)(麻)(要処方)	6mg×7枚		1 枚中 フェンタニルクエン酸塩 6mg (フェンタニルとして 3.82mg)	
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ8mg「第一三共」 (劇)(麻)(要処方)	8mg×7枚		1 枚中 フェンタニルクエン酸塩 8mg (フェンタニルとして 5.09mg)	
経皮吸収型 持続性がん疼痛治療剤 フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ0.5mg「テイコク」 (劇)(麻)(要処方)	0.5mg×7枚	帝 国	1 枚中 フェンタニルクエン酸塩 0.5mg (フェンタニルとして 0.32mg)	①未使用製剤の廃棄 (ライナーから剥がすのに失敗した場合等を含む) ・テープを焼却して下さい。 ・焼却できない場合は、ライナーを剥がし、粘着面を内側に二つ折りにした後、ハサミなどを用いて細断し、通常の医薬品と同様に廃棄する。 ＊シュレッダーを使用した廃棄は、行わない。 ＊院外施用の場合は病院・薬局へ返却するよう患者さん等に指導する。 なお、返却された場合は上記方法により廃棄する。 ②使用済み製剤の廃棄 (施用途中で剥離した場合、途中で施用を中止した場合、貼付直後、上手く貼付できず剥がれた場合も含む) ・テープの粘着面を内側にして貼り合わせた後、通常の医薬品と同様に廃棄する。 ＊シュレッダーを使用した廃棄は、行わない。
経皮吸収型 持続性がん疼痛治療剤 フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ1mg「テイコク」 (劇)(麻)(要処方)	1mg×7枚		1 枚中 フェンタニルクエン酸塩 1mg (フェンタニルとして 0.64mg)	
経皮吸収型 持続性がん疼痛治療剤 フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ2mg「テイコク」 (劇)(麻)(要処方)	2mg×7枚		1 枚中 フェンタニルクエン酸塩 2mg (フェンタニルとして 1.27mg)	
経皮吸収型 持続性がん疼痛治療剤 フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ4mg「テイコク」 (劇)(麻)(要処方)	4mg×7枚		1 枚中 フェンタニルクエン酸塩 4mg (フェンタニルとして 2.55mg)	
経皮吸収型 持続性がん疼痛治療剤 フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ6mg「テイコク」 (劇)(麻)(要処方)	6mg×7枚		1 枚中 フェンタニルクエン酸塩 6mg (フェンタニルとして 3.82mg)	
経皮吸収型 持続性がん疼痛治療剤 フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ8mg「テイコク」 (劇)(麻)(要処方)	8mg×7枚		1 枚中 フェンタニルクエン酸塩 8mg (フェンタニルとして 5.09mg)	

外用薬

品 名	包 装	メーカー	組 成	廃 棄 方 法
経皮吸収型 持続性疼痛治療剤 ワンデュロパッチ 0.84mg (劇)(麻)(要処方)	0.84mg×7枚	ヤンセン ファーマ	1 枚中 フェンタニル 0.84mg	①未使用製剤の廃棄 (ライナーから剥がすのに失敗した場合等を含む) ・パッチを焼却して下さい。 ・焼却できない場合は、ライナーを剥がし、粘着面を内側に二つ折りにした後、ハサミなどを用いて細断し、通常の医薬品と同様に廃棄する。 ＊シュレッダーを使用した廃棄は、行わない。 ＊院外施用の場合は病院・薬局へ返却するよう患者さん等に指導する。 なお、返却された場合は上記方法により廃棄する。 ②使用済み製剤の廃棄 (施用途中で剥離した場合や途中で施用を中止した場合も含む) ・パッチの粘着面を内側にして貼り合せた後、通常の医薬品と同様に廃棄する。 ＊シュレッダーを使用した廃棄は、行わない。
経皮吸収型 持続性疼痛治療剤 ワンデュロパッチ 1.7mg (劇)(麻)(要処方)	1.7mg×7枚		1 枚中 フェンタニル 1.7mg	
経皮吸収型 持続性疼痛治療剤 ワンデュロパッチ 3.4mg (劇)(麻)(要処方)	3.4mg×7枚		1 枚中 フェンタニル 3.4mg	
経皮吸収型 持続性疼痛治療剤 ワンデュロパッチ 5mg (劇)(麻)(要処方)	5mg×7枚		1 枚中 フェンタニル 5mg	
経皮吸収型 持続性疼痛治療剤 ワンデュロパッチ 6.7mg (劇)(麻)(要処方)	6.7mg×7枚		1 枚中 フェンタニル 6.7mg	
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル1日用テープ 0.84mg「明治」 (劇)(麻)(要処方)	0.84mg×7枚	祐 徳	1 枚中 フェンタニル 0.84mg	①未使用製剤の廃棄 (ライナーから剥がすのに失敗した場合等を含む) ・テープを焼却して下さい。 ・焼却できない場合は、ライナーを剥がし、粘着面を内側に二つ折りにした後、ハサミなどを用いて細断し、通常の医薬品と同様に廃棄する。 ＊シュレッダーを使用した廃棄は、行わない。 ＊院外施用の場合は病院・薬局へ返却するよう患者さん等に指導する。 なお、返却された場合は上記方法により廃棄する。 ②使用済み製剤の廃棄 (施用途中で剥離した場合や途中で施用を中止した場合も含む) ・テープの粘着面を内側にして貼り合せた後、通常の医薬品と同様に廃棄する。 ＊シュレッダーを使用した廃棄は、行わない。
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル1日用テープ 1.7mg「明治」 (劇)(麻)(要処方)	1.7mg×7枚		1 枚中 フェンタニル 1.7mg	
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル1日用テープ 3.4mg「明治」 (劇)(麻)(要処方)	3.4mg×7枚		1 枚中 フェンタニル 3.4mg	
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル1日用テープ 5mg「明治」 (劇)(麻)(要処方)	5mg×7枚		1 枚中 フェンタニル 5mg	
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル1日用テープ 6.7mg「明治」 (劇)(麻)(要処方)	6.7mg×7枚		1 枚中 フェンタニル 6.7mg	

外用薬

品 名	包 装	メーカー	組 成	廃 棄 方 法
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル1日用テープ 0.84mg「ユートク」 (劇)(麻)(要処方)	0.84mg×7枚	祐 徳	1 枚中 フェンタニル 0.84mg	①未使用製剤の廃棄 (ライナーから剥がすのに失敗した場合等を含む) ・テープを焼却して下さい。 ・焼却できない場合は、ライナーを剥がし、粘着面を内側に二つ折りにした後、ハサミなどを用いて細断し、通常の医薬品と同様に廃棄する。 ＊シュレッダーを使用した廃棄は、行わない。 ＊院外施用の場合は病院・薬局へ返却するよう患者さん等に指導する。 なお、返却された場合は上記方法により廃棄する。 ②使用済み製剤の廃棄 (施用途中で剥離した場合や途中で施用を中止した場合も含む) ・テープの粘着面を内側にして貼り合せた後、通常の医薬品と同様に廃棄する。 ＊シュレッダーを使用した廃棄は、行わない。
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル1日用テープ 1.7mg「ユートク」 (劇)(麻)(要処方)	1.7mg×7枚		1 枚中 フェンタニル 1.7mg	
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル1日用テープ 3.4mg「ユートク」 (劇)(麻)(要処方)	3.4mg×7枚		1 枚中 フェンタニル 3.4mg	
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル1日用テープ 5mg「ユートク」 (劇)(麻)(要処方)	5mg×7枚		1 枚中 フェンタニル 5mg	
経皮吸収型 持続性癌疼痛治療剤 フェンタニル1日用テープ 6.7mg「ユートク」 (劇)(麻)(要処方)	6.7mg×7枚		1 枚中 フェンタニル 6.7mg	