

守ろう 未来の自分

子宮頸がんって何?

症状

- 出血
- 膿のようなおりもの

初期はほとんど自覚症状が無いいため発見が遅れることも…


治療

進行度に合わせて、手術療法、放射線療法、化学療法のいずれか、または複数を組み合わせて行う

進行度によっては妊娠や出産に影響し、**早産のリスク**が高まったり、**子宮摘出によって妊娠ができなくなったり**することがある


子宮頸がんとは

子宮の入口(子宮頸部)にできるがんのこと



子宮頸部

子宮頸がんの5年生存率



【出典】院内がん登録生存率集計(2014-2015年)

がん検査による子宮頸がんの早期発見で生存率が上がる!

感染経路

性的接触によるヒトパピローマウイルス(HPV)の感染

性経験のある人の多くが“一生に一度は感染する”といわれるどこにでもあるウイルス

一部の人でウイルスが持続し、**子宮頸がん発生**の恐れ

ほとんどは自然に消える

しかし

子宮頸がんは予防が可能!!

子宮頸がん で苦しまないために 私たちができること

HPVワクチンによる感染予防

子宮頸がんの原因となるHPVの感染を防ぎ、将来の子宮頸がん発症リスクを大きく下げる

子宮頸がん検診による早期発見

早期発見・早期治療により、がんて亡くなることを防ぎ、治療が軽度ですむ


でも…

そもそもHPVワクチンって何なんだろう

ワクチンの副反応はどんなものがあるんだろう

検診ってどうやって受けるの?

検診やワクチンの対象年齢は何歳だろう



打って予防、受けて安心

HPVワクチンについて



効果

子宮頸がんの原因となるHPVの約90%^{※1}の感染を防ぎ、発症リスクを非接種者の20分の1^{※1}まで抑えられます。

☆効果的な接種の時期☆
性的接触で感染するため、性交経験前の10代前半での接種が最も効果的です。


ワクチンに関する疑問や不安なことは、かかりつけ医などに相談しましょう。

【出典】

※1 知ってくださいHPVと子宮頸がんのこと(国立がん研究センターがん対策研究所)
※2 小学校6年～高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(詳細版)(厚生労働省)

定期接種

小学6年生～高校1年生
相当の女の子は無料で打つことができます。



副反応

注射した部分の腫れ、赤みなどが起こることがあります。まれに(接種1万人あたり約2人^{※2})、重いアレルギー症状や神経系の症状が起こることがあります。

もっと詳しく知りたい方へ

予防接種の案内は市町が行っています。

ワクチンに関する詳しい情報、各市町の間合せ窓口は県ホームページからチェック！

▼長崎県ホームページ HPVワクチンについて



子宮頸がん検診について



対象者・受診間隔

20歳以上・2年に1回

検診の効果

がんを無症状のうちに早期発見・早期治療し、がんで亡くなることを防ぐことにつながります。国も、がん死亡を減らす効果が確実で、利益が不利益を上回る、科学的根拠のある検診としてすすめています。^{※3}

【出典】※3 厚生労働省HP(がん検診)

検診方法

医師が子宮の入口を専用のブラシやヘラで擦って細胞を採取

採取した細胞を顕微鏡で確認し、異常がないか調べる

検診の受け方・問合せ先

働いている方は、職場で実施されるがん検診を受診できます。働いていない方や、職場で受ける機会がない方は、市町が実施する住民健診を受診できます。

各市町の間合せ窓口は県ホームページからチェック！

▼長崎県ホームページ がん検診について



- 内容制作：令和7年度長崎北陽台高校2年生医療衛生B班
- がん検診に関する問合せ：長崎県医療政策課がん・疾病対策班直通095-895-2467
- HPVワクチンに関する問合せ：長崎県地域保健推進課感染症対策担当直通095-895-2466