

長崎県感染症発生動向調査速報

平成29年第45週 平成29年11月6日（月）～平成29年11月12日（日）


☆定点報告疾患（定点当たり報告数の上位3疾患）の発生状況

（1） 感染性胃腸炎

第45週の報告数は168人で、前週より27人多く、定点当たりの報告数は3.82であった。

年齢別では、1歳（49人）、1歳未満（19人）、10～14歳（19人）の順に多かった。

定点当たり報告数の多い保健所は、県南保健所（7.60）、県北保健所（5.33）、西彼保健所（4.50）、上五島保健所（4.50）であった。




（2） A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

第45週の報告数は91人で、前週より16人多く、定点当たりの報告数は2.07であった。

年齢別では、10～14歳（15人）、5歳（14人）、7歳（10人）の順に多かった。

定点当たり報告数の多い保健所は、県南保健所（5.40）、県央保健所（3.50）、西彼保健所（3.25）であった。




（3） インフルエンザ

第45週の報告数は136人で、前週より4人多く、定点当たりの報告数は1.94であった。

年齢別では、10～14歳（16人）、5歳（14人）、6歳（14人）の順に多かった。

定点当たり報告数の多い保健所は、佐世保市保健所（8.09）、県北保健所（4.00）、五島保健所（2.60）であった。



○ 当年(長崎県) — 前年(長崎県)
× 当年(全国) - - 前年(全国)

☆上位3疾患の概要

【感染性胃腸炎】

第45週の報告数は、前週より27人増加して168人となり、定点当たりの報告数は3.82でした。壱岐地区以外から報告があがっており、県南地区（7.60）、県北地区（5.33）、西彼地区（4.50）、上五島地区（4.50）の定点当たり報告数は他の地区より多い状況ですので、今後の動向に注意が必要です。

本疾患は、細菌又はウイルスなどの病原微生物による嘔吐、下痢を主症状とする感染症です。年齢別に見ると、報告の多くを乳幼児が占めています。原因はノロウイルスをはじめとするカリシウイルスやロタウイルス、エンテロウイルス、アデノウイルスなどのウイルス感染による場合が主流ですが、腸管出血性大腸菌などの細菌が原因となる場合もあります。原因微生物のうち、ロタウイルスについてはすでにワクチンが認可されていますので、予防することが出来るウイルスです。特に乳幼児には、手洗いの励行とともに、体調管理に注意して感染防止に努め、早めに医療機関を受診させましょう。

【A群溶血性レンサ球菌咽頭炎】

第45週の報告数は、前週より16人増加して91人となり、定点当たりの報告数は2.07でした。壱岐地区、上五島地区以外から報告があがっており、特に県南地区（5.40）、県央地区（3.50）、西彼地区（3.25）の定点当たり報告数は、他の地区より多い状況ですので、今後の動向に注意が必要です。

本疾患の好発年齢は5歳から15歳で、鼻汁、唾液中のA群溶血性レンサ球菌を含む飛沫などによってヒトからヒトへ感染します。また、食品を介しての経口感染もあります。潜伏期間は約1日から4日で、突然の発熱（高熱）、咽頭痛、全身倦怠感、時に皮疹もあります。急性期患者の感染力は強いですが、適切な抗菌薬の投与により、多くは1日から2日後には症状も消失し、感染力も著しく低下します。不十分な治療は無症状保菌者を生じやすいため、早期に医療機関を受診するとともに、手洗いやうがいを励行し、感染防止に努めましょう。

【インフルエンザ】

第45週の報告数は、前週より4人増加して136人となり、定点当たりの報告数は1.94でした。壱岐地区、対馬地区以外から報告があがっており、佐世保地区（8.09）、県北地区（4.00）、五島地区（2.60）の定点当たり報告数は、他の地区より多い状況ですので、今後の動向に注意が必要です。

インフルエンザは、インフルエンザウイルスを原因とする気道感染症で、他の原因によるかぜ症候群より重症化しやすい傾向がありますので注意を要します。感染経路は、咳やくしゃみの飛沫による飛沫感染と、飛沫等に含まれるウイルスが付着した手指で自分の眼や口、鼻を触ることによって成立する接触感染があります。1日から3日間の潜伏期間のあとに38度以上の発熱、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛、関節痛などの全身症状が突然現れます。これに続いて咳、鼻汁などの上気道炎症が起こり、約1週間で軽快するのが典型的なインフルエンザの症状です。呼吸器、循環器等に慢性疾患を持つ方は、その病状が悪化することもあります。小さなお子さんの場合、熱性痙攣や気管支喘息を誘発することもあります。また、インフルエンザワクチンは、接種すればインフルエンザに絶対にかからないというものではありませんが、発症及び重症化を一定程度予防する効果があります。ワクチンの予防効果が期待できるのは、接種した（13歳未満の場合は2回接種した）2週間から5か月程度までと考えられていますので、早めにワクチンを接種しておくことが望ましいです。

★トピックス：インフルエンザが流行期入り！

第44週の定点当たりの報告数が「1.89」と流行開始の目安としている「1」を上回ったため、11月10日に長崎県よりインフルエンザの流行期入りが発表されました。第45週は「1.89」をさらに上回る「1.94」の報告があがっています。11月下旬から12月上旬にかけて流行期入りしていた例年とは違い、今シーズンは、半月以上早い流行期入りとなりました。このことから、流行のピーク時期も早くなることが予想されます。また、全国的に見ても長崎県は、沖縄県（3.78）に次いで2番目に多い報告数となっていて、特に佐世保地区、県北地区、五島地区は他の地域に比べて報告数が多く、他の地域も少しずつですが増加傾向にあります。尚、本県では、現在までのインフルエンサーベイランスにおいて、検査を実施した4検体からA/H3型が2検体、A/H1pdm09型が1検体およびB型が1検体検出されています。

インフルエンザには「うつらない」ことはもちろん「うつさない」ことも重要です。早めのワクチンの接種や外出後の手洗いやうがいの励行、定期的な換気、「咳エチケット」の徹底など、積極的な感染予防を心がけましょう。

～ 咳エチケット ～

- ・マスクの着用（咳をしている人には着用を促す）
- ・マスクのない場合は、口と鼻をティッシュなどで押さえる
- ・人に向けて咳やくしゃみをしていない
- ・使用したティッシュは、すぐにゴミ箱へ捨てる
- ・咳やくしゃみを受け止めた手は、すぐに洗う

など、感染拡大を防ぐための「咳をするときのマナー」です。

参考：<https://www.pref.nagasaki.jp/object/kenkaranooshirase/oshirase/175250.html>

（長崎県医療政策課：インフルエンザ流行期入りの発表）

長崎県におけるインフルエンザ報告数の推移

