

# 長崎県感染症発生動向調査速報（週報）

2019年第47週 2019年11月18日（月）～ 2019年11月24日（日）

## 定点報告疾患（定点当たり報告数の上位3疾患）の発生状況


### （1）インフルエンザ

第47週の報告数は289人で、前週より35人多く、定点当たりの報告数は4.13であった。  
年齢別では、10～14歳（66人）、30～39歳（26人）、5歳（23人）の順に多かった。  
定点当たり報告数の多い保健所は、県南保健所（15.88）、対馬保健所（10.67）、長崎市保健所（5.71）であった。




### （2）感染性胃腸炎

第47週の報告数は114人で、前週より17人少なく、定点当たりの報告数は2.59であった。  
年齢別では、1歳（20人）、2歳（16人）、10～14歳（13人）の順に多かった。  
定点当たり報告数の多い保健所は、佐世保市保健所（6.50）、県央保健所（4.33）であった。



### （3）手足口病

第47週の報告数は107人で、前週より27人少なく、定点当たりの報告数は2.43であった。  
年齢別では、1歳（42人）、2歳（25人）、4歳（15人）の順に多かった。  
定点当たり報告数の多い保健所は、県北保健所（8.67）、佐世保市保健所（6.33）であった。



○ 当年(長崎県)      — 前年(長崎県)  
× 当年(全国)      - - - 前年(全国)

## 上位3疾患の概要

### 【インフルエンザ】

第47週の報告数は、前週より35人増加して289人となり、定点当たりの報告数は4.13でした。地区別にみると、壱岐地区、五島地区、上五島地区以外から報告があがっており、県南地区（15.88）、対馬地区（10.67）、長崎地区（5.71）の定点当たり報告数は、他の地区より多い状況で、今後の動向に注意が必要です。

インフルエンザは、インフルエンザウイルスを原因とする気道感染症で、他の原因によるかぜ症候群より重症化しやすい傾向がありますので注意を要します。感染経路は、咳やくしゃみによる飛沫感染と、飛沫等に含まれるウイルスが附着した手指で自分の眼や口、鼻を触ることによって成立する接触感染があります。1日から3日間の潜伏期間のあとに38度以上の発熱、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛、関節痛などの全身症状が突然現れます。これに続いて咳、鼻汁などの上気道炎症が起こり、約1週間で軽快するのが典型的なインフルエンザの症状です。呼吸器、循環器等に慢性疾患を持つ方は、その病状が悪化することもあります。小さなお子さんの場合、熱性痙攣や気管支喘息を誘発することもあります。また、インフルエンザワクチンは、接種すればインフルエンザに絶対にかからないというものではありませんが、発症及び重症化を一定程度予防する効果があります。ワクチンの予防効果が期待できるのは、接種した（13歳未満の場合は2回接種した）2週間から5か月程度までと考えられていますので、ワクチンを接種しておくことが望ましいです。

## 【感染性胃腸炎】

第47週の報告数は、前週より17人減少して114人となり、定点当たりの報告数は2.59でした。地区別にみると、壱岐地区、対馬地区以外から報告があがっており、佐世保地区（6.50）、県央地区（4.33）の定点当たり報告数は、他の地区より多い状況で、今後の動向に注意が必要です。

本疾患は、細菌又はウイルスなどの病原微生物による嘔吐、下痢を主症状とする感染症です。原因はノロウイルスをはじめとするカリシウイルスやロタウイルス、エンテロウイルス、アデノウイルスなどのウイルス感染による場合が主流ですが、腸管出血性大腸菌などの細菌が原因となる場合もあります。原因微生物のうち、ロタウイルスについてはすでにワクチンが認可されていますので、予防することが出来るウイルスです。特に乳幼児には、手洗いの励行とともに、体調管理に注意して感染防止に努め、早めに医療機関を受診させましょう。

## 【手足口病】

第47週の報告数は、前週より27人減少して107人となり、定点当たりの報告数は2.43でした。地区別にみると、壱岐地区、上五島地区以外から報告があがっており、県北地区（8.67）、佐世保地区（6.33）の定点当たり報告数は、他の地区より多い状況で、今後の動向に注意が必要です。

手足口病は、例年5月頃から報告数が増加し、夏場にピークを迎えます。本疾患は、口腔粘膜および四肢末端に現れる水疱性発疹を特徴とする乳幼児に多いウイルス性疾患です。感染経路は、糞口感染が主体で、飛沫感染や水疱内容液からも感染します。急性期に最もウイルスの排泄量が多く、回復後も2週間から4週間程度は、便中にウイルスが排泄されるため感染源となりえますので、保護者は乳幼児に手洗い、うがいを励行させて、感染防止に努め体調管理に気をつけてあげましょう。原因ウイルスの種類によっては手足口病とともに無菌性髄膜炎や脳炎を併発させることもありますので、保護者は早めに医療機関を受診させてあげるよう心掛けましょう。

## トピックス：インフルエンザを予防しましょう！

インフルエンザの全国的な流行は、例年11月下旬から12月上旬頃に始まり、年が明けて1月から3月頃にピークを迎えます。本県では、1月から本格的な流行が始まり、以後患者数が急増して2月初旬から中旬にかけてピークに達する傾向にあります。今シーズンは、例年よりかなり早く流行入りしました。

第47週の定点当たりの報告数は、前週の「3.63」を上回り「4.13」の報告があがっております。

全国の定点当たりの報告数も流行の目安となる「1」を超えたため、11月15日に全国的にも流行入りの発表が出されました。

今後、患者数が増加し、本格的な流行が予想されますので、早めの対策が必要です。予防には、ワクチン接種と「咳エチケット」の徹底などの積極的な感染予防策が有効です。ワクチンは接種すればインフルエンザに絶対にかからないというものではありませんが、発症及び重症化を一定程度予防する効果があります。ワクチンの予防効果が期待できるのは、接種した（13歳未満の場合は2回接種した）2週間から5か月程度までと考えられています。10月から接種可能となっていますので、流行に備えてワクチンを接種しておくことが望ましいです。

今後の動向に注意し、ワクチンの接種や外出後の手洗いの励行、「咳エチケット」の徹底など感染予防を心がけましょう。

～ 咳エチケット ～

- ・マスクの着用（咳をしている人には着用を促す）
- ・マスクのない場合は、口と鼻をティッシュなどで押さえる
- ・人に向けて咳やくしゃみをしない
- ・使用したティッシュは、すぐにゴミ箱へ捨てる
- ・咳やくしゃみを受け止めた手は、すぐに洗う

など、感染拡大を防ぐための「咳をするときのマナー」です。

（参考）厚生労働省 インフルエンザ総合ページ（外部のページに移動します。）  
[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/kenkou/kekaku-kansenshou/infuenza/index.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekaku-kansenshou/infuenza/index.html)

### 長崎県におけるインフルエンザ報告数の推移

