

長崎県感染症発生動向調査速報（週報）

令和2年第3週 令和2年1月13日（月）～令和2年1月19日（日）


☆定点報告疾患（定点当たり報告数の上位3疾患）の発生状況

（1）インフルエンザ

第3週の報告数は1,741人で、前週より272人多く、定点当たりの報告数は24.87であった。

年齢別では、10～14歳（324人）、40～49歳（137人）、6歳（123人）の順に多かった。

定点当たり報告数の多い保健所は、壱岐保健所（54.33）、県北保健所（51.50）、上五島保健所（39.67）であった。




（2）感染性胃腸炎

第3週の報告数は374人で、前週より133人多く、定点当たりの報告数は8.50であった。

年齢別では、1歳（77人）、2歳（40人）、10～14歳（36人）の順に多かった。

定点当たり報告数の多い保健所は、長崎市保健所（12.90）、佐世保市保健所（11.17）、西彼保健所（11.00）であった。




（3）A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

第3週の報告数は62人で、前週より1人多く、定点当たりの報告数は1.41であった。

年齢別では、4歳（9人）、2歳（8人）、3歳（7人）の順に多かった。

定点当たり報告数の多い保健所は、県央保健所（4.17）、県南保健所（2.00）、佐世保市保健所（1.83）であった。



○ 当年(長崎県) 前年(長崎県)
× 当年(全国) 前年(全国)

☆上位3疾患の概要

【インフルエンザ】

第3週の報告数は、前週より272人増加して1,741人となり、定点当たりの報告数は24.87でした。県内全域から報告があがっており、地区別にみると、壱岐地区（54.33）、県北地区（51.50）、上五島地区（39.67）の定点当たり報告数は、他の地区より多く、今後も動向に注意が必要です。

インフルエンザは、インフルエンザウイルスを原因とする気道感染症で、他の原因によるかぜ症候群より重症化しやすい傾向がありますので注意を要します。感染経路は、咳やくしゃみによる飛沫感染と、飛沫等に含まれるウイルスが付着した手指で自分の眼や口、鼻を触ることによって成立する接触感染があります。1日から3日間の潜伏期間のあとに38度以上の発熱、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛、関節痛などの全身症状が突然現れます。これに続いて咳、鼻汁などの上気道炎症が起こり、約1週間で軽快するのが典型的なインフルエンザの症状です。呼吸器、循環器等に慢性疾患を持つ方は、その病状が悪化することもあります。小さなお子さんの場合、熱性痙攣や気管支喘息を誘発することもあります。また、インフルエンザワクチンは、接種すればインフルエンザに絶対にかからないというものではありませんが、発症及び重症化を一定程度予防する効果があります。ワクチンの予防効果が期待できるのは、接種した（13歳未満の場合は2回接種した）2週間から5か月程度までと考えられていますので、ワクチンを接種しておくことが望ましいです。

【感染性胃腸炎】

第3週の報告数は、前週より133人増加して374人となり、定点当たりの報告数は8.50でした。地区別にみると、長崎地区（12.90）、佐世保地区（11.17）、西彼地区（11.00）の定点当たり報告数は、他の地区より多い状況です。多くの地区で、前週より報告数が増加していますので、今後の動向に注意が必要です。

本疾患は、細菌又はウイルスなどの病原微生物による嘔吐、下痢を主症状とする感染症です。原因はノロウイルスをはじめとするカリシウイルスやロタウイルス、エンテロウイルス、アデノウイルスなどのウイルス感染による場合が主流ですが、腸管出血性大腸菌などの細菌が原因となる場合もあります。原因微生物のうち、ロタウイルスについてはすでにワクチンが認可されていますので、予防することが出来るウイルスです。特に乳幼児には、手洗いの励行とともに、体調管理に注意して感染防止に努め、早めに医療機関を受診させましょう。

【A群溶血性レンサ球菌咽頭炎】

第3週の報告数は、前週より1人増加して62人となり、定点当たりの報告数は1.41でした。地区別にみると、壱岐地区、上五島地区以外から報告があがっており、県央地区（4.17）、県南地区（2.00）、佐世保地区（1.83）の定点当たり報告数は、他の地区より多い状況で、今後の動向に注意が必要です。

本疾患の好発年齢は5歳から15歳で、鼻汁、唾液中のA群溶血性レンサ球菌を含む飛沫などによってヒトからヒトへ感染します。また、食品を介しての経口感染もあります。潜伏期間は約1日から4日で、突然の発熱（高熱）、咽頭痛、全身倦怠感、時に皮疹もあります。急性期患者の感染力は強いですが、適切な抗菌薬の投与により、多くは1日から2日後には症状も消失し、感染力も著しく低下します。不十分な治療は無症状保菌者を生じやすいため、早めに医療機関を受診するとともに、手洗いやうがいを励行し、感染防止に努めましょう。

★トピックス：インフルエンザ流行注意報が発表されています

第3週の定点当たりの報告数は、前週の「20.99」より増加し、「24.87」となりました。令和元年12月19日に長崎県医療政策課は、インフルエンザ流行注意報を発表しています。

多くの地区で報告数が前週よりも増加しており、特に壱岐地区（54.33）、県北地区（51.50）、上五島地区（39.67）では、警報レベル開始基準値「30」を上回っています。対馬地区（29.67）、佐世保地区（28.45）も、報告数が多く、今後の動向に注意が必要です。

長崎県の過去5年のデータを見ると、新年の第3週から第6週に流行のピークを迎えています。今後も患者数の増加が懸念されますので、より一層の注意が必要です。ワクチンの接種や外出後の手洗いやうがいの励行、定期的な換気、「咳エチケット」の徹底など、積極的な感染予防を心がけましょう。

～ 咳エチケット ～

- ・マスクの着用（咳をしている人には着用を促す）
- ・マスクのない場合は、口と鼻をティッシュなどで押さえる
- ・人に向けて咳やくしゃみをしない
- ・使用したティッシュは、すぐにゴミ箱へ捨てる
- ・咳やくしゃみを受け止めた手は、すぐに洗う

など、感染拡大を防ぐための「咳をするときのマナー」です。

（参考）厚生労働省 インフルエンザ総合ページ（外部のページに移動します。）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekaku-kansenshou/infuenza/index.html

（参考）長崎県医療政策課 インフルエンザの流行注意報の発表
<http://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2019/12/1576735646.pdf>

長崎県におけるインフルエンザ報告数の推移

