

長崎県感染症発生動向調査速報（週報）

2025年第33週 2025年8月11日（月）～2025年8月17日（日）2025年8月21日作成


☆定点※報告疾患（定点当たり報告数の上位3疾患）の発生状況

（1）新型コロナウイルス感染症

第33週の報告数は371人で、前週より20人少なく、定点当たりの報告数は7.27であった。

年齢別では、10歳未満（55人）、70～79歳（51人）の順に多かった。

定点当たり報告数の多い保健所は、対馬保健所（12.67）、上五島保健所（11.33）、壱岐保健所（10.00）であった。




（2）伝染性紅斑

第33週の報告数は54人で、前週より14人少なく、定点当たりの報告数は1.74であった。

年齢別では、5歳（9人）、7歳（8人）、3歳（7人）の順に多かった。

定点当たり報告数の多い保健所は、佐世保市保健所（3.75）、県央保健所（2.80）、県南保健所（2.67）であった。




（3）感染性胃腸炎

第33週の報告数は40人で、前週より47人少なく、定点当たりの報告数は1.29であった。

年齢別では、1歳未満（8人）、1歳（7人）、10～14歳（5人）の順に多かった。

定点当たり報告数の多い保健所は、県北保健所（4.00）、壱岐保健所（2.50）、佐世保市および西彼保健所（2.00）であった。



○ 当年（長崎県） — 前年（長崎県）
× 当年（全国） - - 前年（全国）

※急性呼吸器感染症定点数：51、小児科定点数：31、眼科定点数：7、基幹定点数：12
（2025年第15週より定点数が変更されました）

☆上位3疾患の概要

【新型コロナウイルス感染症】

第33週の報告数は371人で、定点当たり報告数は7.27でした。地区別にみると、対馬地区（12.67）、上五島地区（11.33）、壱岐地区（10.00）は他の地区より多くなっています。前週より減少しましたが、今後も動向に注意しましょう。

本疾患の主な症状は、発熱、咳、全身倦怠感等の感冒様症状で、主に飛沫感染や接触感染により感染します。場面に応じたマスクの着用や手洗い、換気、三密の回避などの基本的な感染対策に努めましょう。

【伝染性紅斑】

第33週の報告数は54人で、定点当たり報告数は1.74でした。第32週に警報レベル開始基準値「2.0」を超え、2週続けて警報レベルの報告数となりました。地区別では、佐世保地区（3.75）、県央地区（2.80）、県南地区（2.67）、長崎地区（1.83）は警報レベルの報告数となっています。

本疾患は、ヒトパルボウイルスB19による感染症で、小児を中心にみられる流行性の発しん性の病気です。約10～20日の潜伏期間の後、微熱やかぜの症状などがみられ、その後、両頬に蝶の羽のような境界鮮明な赤い発しん（紅斑）、体や手・足に網目状やレース状の発しんが広がりますが、ほとんどは合併症を起こすことなく自然に回復します。一方で、これまで感染したことのない女性が妊娠中に感染した場合、胎児にも感染し、胎児の異常や流産のリスクとなる可能性がありますので、注意が必要です。感染経路は、飛沫感染や接触感染ですので、手洗いやマスクの適切な着用など感染予防に努めましょう。

【感染性胃腸炎】

第33週の報告数は40人で、定点当たり報告数は1.29でした。地区別では、県北地区（4.00）、壱岐地区（2.50）、佐世保地区（2.00）、西彼地区（2.00）が他の地区より多くなっています。

本疾患は、細菌又はウイルスなどの病原微生物による嘔吐、下痢を主症状とする感染症です。原因はノロウイルスやロタウイルス、エンテロウイルス、アデノウイルスなどのウイルス感染による場合が主流ですが、腸管出血性大腸菌などの細菌が原因となる場合もあります。手洗いの励行とともに、体調管理に注意して感染防止に努め、早めに医療機関を受診しましょう。


☆トピックス：伝染性紅斑が流行しています

伝染性紅斑は、ヒトパルボウイルスB19による感染症で、小児を中心にみられる流行性の発しん性の病気です。両頬がリングのように赤くなることから、「リング病」と呼ばれることもあります。約10～20日の潜伏期間の後、微熱やかぜの症状などがみられ、その後、両頬に蝶の羽のような境界鮮明な赤い発しん（紅斑）が現れます。続いて、体や手・足に網目状やレース状の発しんが広がりますが、これらの発しんは1週間程度で消失し、ほとんどは合併症を起こすことなく自然に回復します。一方で、これまで伝染性紅斑に感染したことのない女性が妊娠中に感染した場合、胎児にも感染し、胎児水腫などの重篤な状態や、流産のリスクとなる可能性がありますので、注意が必要です。


2025年第33週の定点当たり報告数は「1.74」で、2週続けて警報レベルの報告数となりました。地区別でも、佐世保地区（3.75）、県央地区（2.80）、県南地区（2.67）、長崎地区（1.83）は警報レベルの報告数となっています。

感染経路は、飛沫感染や接触感染で、かぜ症状のある時期にウイルスの排出が最も多くなるといわれています。治療薬やワクチンがないため、感染予防が重要です。特に妊娠中の方やそのご家族ではかぜ症状がある方との接触をできる限り避け、手洗いやマスクの適切な着用など感染予防に努めましょう。

長崎県における伝染性紅斑報告数の推移



長崎県における伝染性紅斑の年齢別報告数（2025年第1週～33週）



☆トピックス：マダニやツツガムシが媒介する感染症に注意しましょう

マダニ類やツツガムシ類は、野外の藪や草むらに生息しているダニで、野生動物が出没する環境に多く生息しているほか、民家の裏山、裏庭、畑やあぜ道などにも生息しています。マダニ類は「日本紅斑熱」や「重症熱性血小板減少症候群（SFTS）」を媒介し、ツツガムシ類は「つつが虫病」を媒介します。

マダニ類が媒介する日本紅斑熱は、発熱・発疹が主な症状で、ダニの刺し口が多くの患者で認められます。県内では2025年第33週までに16件の報告があり、過去5年の同時期と比較して、多く報告があがっています。


マダニ等が媒介する感染症の予防には、ダニに咬まれないことが重要です。野外で活動する際は、長袖、長ズボン、長靴を着用するなどして肌の露出を極力避け、マダニに有効な虫よけ剤を使用して感染防止に心がけましょう。もし、マダニ等に咬まれていたことに気づいた場合、無理に取り除こうとせず、皮膚科等の医療機関で適切に処置してもらいましょう。また、咬まれた後に発熱等の症状があった場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。受診した医療機関では、咬まれた状況などをできるだけ詳細に説明しましょう。

長崎県におけるダニ媒介感染症の発生件数

年	2020	2021	2022	2023	2024	2025
SFTS	8 (5)	6 (2)	6 (8)	13 (9)	13 (11)	9
日本紅斑熱	18 (4)	28 (12)	22 (3)	14 (9)	23 (14)	16
つつが虫病	11 (0)	14 (3)	7 (0)	15 (4)	11 (1)	0

※（ ）は第33週までの発生件数

長崎県における日本紅斑熱の診断週別累積患者報告数




☆トピックス：新型コロナウイルス感染症に注意しましょう

新型コロナウイルス感染症の長崎県における第33週の定点当たり報告数は「7.27」でした。地区別では、対馬地区（12.67）、上五島地区（11.33）、壱岐地区（10.00）が多くなっています。年代別にみると、10歳未満（14.8%）、70代（13.7%）が多くなっています。

今後も場面に応じたマスクの着用や手洗い、換気、三密の回避などの基本的な感染対策に努めましょう。

新型コロナウイルス感染症 定点当たり報告数推移



◆全数届出の感染症

2類感染症：結核 無症状病原体保有者 女性（20代・1名）
 3類感染症：報告なし
 4類感染症：日本紅斑熱 患者 男性（50代・1名、80代以上・1名） 女性（70代・1名）
 レジオネラ症 患者 男性（40代・1名、50代・1名、80代以上・1名）
 5類感染症：侵襲性肺炎球菌感染症 患者 男性（60代・1名）
 梅毒 患者 男性（40代・1名）
 破傷風 患者 女性（70代・1名）
 百日咳 患者 男性（10歳未満・5名、10代・3名）
 女性（10歳未満・2名、10代・2名、30代・1名、60代・1名）

◆定点把握の対象となる5類感染症

(1) 疾病別・週別発生状況 (第28～33週、7/7～8/17)

疾 患 名	定 点 当 た り 患 者 数					
	28週	29週	30週	31週	32週	33週
	7/7～	7/14～	7/21～	7/28～	8/4～	8/11～
インフルエンザ	0.49	1.12	0.71	0.16	0.41	0.18
新型コロナウイルス感染症	2.76	3.72	4.25	6.33	7.67	7.27
RSウイルス感染症	0.39	0.33	0.26	0.42	0.52	0.42
咽頭結膜熱	0.52	0.20	0.32	0.39	0.58	0.23
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	2.84	3.20	1.65	2.10	2.35	1.16
感染性胃腸炎	4.03	3.40	2.39	3.06	2.81	1.29
水痘	0.61	0.23	0.10	0.16	0.23	0.26
手足口病	0.58	0.27	0.32	0.26	0.13	0.06
伝染性紅斑（リンゴ病）	1.26	1.57	1.26	1.35	2.19	1.74
突発性発しん	0.61	0.37	0.39	0.42	0.45	0.16
ヘルパンギーナ	4.32	2.30	1.23	0.97	0.65	0.52
流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）	0.10	0.03	0.06	0.03	0.03	0.06
急性出血性結膜炎	0.50	0.13		0.13	0.29	
流行性角結膜炎	2.00	1.38	1.13	3.50	1.71	1.00
細菌性髄膜炎		0.09				
無菌性髄膜炎	0.08		0.08	0.08		
マイコプラズマ肺炎	0.17	0.45	0.42	0.17	0.75	0.67
クラミジア肺炎（おたふく病は除く）						
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	0.08					
急性呼吸器感染症（ARI）	57.65	55.24	48.75	56.96	59.10	33.02

(2) 疾病別・保健所管内別発生状況 (第33週、8/11～8/17) ※赤字：警報レベル、青字：注意報レベル

疾 患 名	定 点 当 た り 患 者 数 (県・保健所管轄別)										
	県	佐世保市	長崎市	壱岐	西彼	県央	県南	県北	五島	上五島	対馬
インフルエンザ	0.18		0.18		0.20	0.38			0.33		0.67
新型コロナウイルス感染症	7.27	7.14	6.18	10.00	2.40	7.00	7.60	8.67	6.33	11.33	12.67
RSウイルス感染症	0.42	0.75	1.00	0.50	0.67	0.20					
咽頭結膜熱	0.23		0.17		0.67	0.40	0.33	0.50			
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	1.16	1.75	0.50		1.00	0.60	3.67	1.50	0.50	0.50	2.00
感染性胃腸炎	1.29	2.00	1.50	2.50	2.00	0.40	0.67	4.00			
水痘	0.26	1.50	0.17		0.33						
手足口病	0.06		0.33								
伝染性紅斑（リンゴ病）	1.74	3.75	1.83	1.00	0.67	2.80	2.67	1.00			
突発性発しん	0.16	0.75			0.33					0.50	
ヘルパンギーナ	0.52		0.33	1.50		1.20	0.33				2.00
流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）	0.06		0.33								
急性出血性結膜炎											
流行性角結膜炎	1.00		1.67		1.00	1.00					
細菌性髄膜炎											
無菌性髄膜炎											
マイコプラズマ肺炎	0.67	1.00	1.33		1.00		1.00				1.00
クラミジア肺炎（おたふく病は除く）											
感染性胃腸炎（ロタウイルス）											
急性呼吸器感染症（ARI）	33.02	43.57	40.00	32.33	36.80	33.25	20.60	27.67	10.00	29.67	29.00