

ノリ養殖情報(第5報)

令和7年11月12日

長崎県 島原振興局 県南水産業普及指導センター

TEL:0957-64-0487

- 今年度の調査は、10月中旬から3月下旬までの期間に、陸上調査を17回、海上調査を6回の合計23回予定しています。
- 今回の調査は【陸上】調査です。

1. 調査結果

調査日：11月10日(月) 天候：くもり 気温：18.0 °C(5:05 時点)

(今回(11/10)の水温等の測定時間帯 5:04～7:38) 前回と時間帯が異なるので注意してください

(前回(11/4)の水温等の測定時間帯 12:20～14:52)

調査点		水温 °C		比重 $\sigma 15$	栄養塩:無機態窒素 $\mu\text{g-at/L}$	クロロ フィルa値	病害 検鏡結果	
		今回	前回 11月4日				アカ	ツボ
A. 吾妻(守山)	支柱	16.9	18.8	22.0				
B. 古部	支柱	16.6	18.5	22.7				
1. 神代	支柱	17.5	19.2	22.0	21.5	8.7	13.7	
2. 仲よし下	支柱	16.0	20.6	23.0	36.1	20.3	27.0	
3. 半田	支柱	17.6	20.4	19.8	302.8	270.2	18.1	
4. 三会	支柱	18.3	20.4	24.3	26.7	22.7	18.1	

※ 栄養塩の期待値は7.0 $\mu\text{g-at/L}$ 以上です。

●主な植物プランクトン (単位:細胞/mL)

植物プランクトン (優占種)	小型珪藻			大型珪藻	
	キートセロス属	スケレトネマ属	レブトリンドラス	リゾソレニア属	コシノディスカス属
1. 神代		8	3		
2. 仲よし下			2	4	1
3. 半田	6			2	
4. 三会	12			5	

●調査結果概要

- ・水温は、16.0°C～18.3°C。海水比重(σ15)は、19.8～24.3。
- ・漁場に設置している温度計の11月5日から11月10日までの測定結果は11.7～21.6°C
　昨年同時期(10.1～22.6°C)で推移しました。
- ・植物プランクトンは、キートセロス属(最高12細胞/mL)、リゾソレニア属(最高5細胞/mL)等
　が確認されました。

2. 赤潮発生状況

- 福岡県：柳川市地先にかけてコシノディスクス属による着色域が確認されました
(10月9日～)。
- 佐賀県・熊本県：赤潮発生なし。

3. 他県の情報

- 佐賀県・福岡県の採苗は11月4日。
　熊本県の採苗は11月6日。

4. 本県の情報

- 採苗開始日は、11月4日。