

ノリ養殖情報(第7報)

令和7年11月26日

長崎県 島原振興局 県南水産業普及指導センター

TEL:0957-64-0487

- 今年度の調査は、10月中旬から3月下旬までの期間に、陸上調査を17回、海上調査を6回の合計23回予定しています。
- 今回の調査は【海上】調査です。

1. 調査結果

調査日：11月24(月) 天候：くもり～晴れ 気温：17.2 °C (8:55 時点)

(今回(11/24)の水温等の測定時間帯 8:55～10:15) 前回と時間帯が異なるので注意してください

(前回(11/17)の水温等の測定時間帯 11:09～14:14)

調査点		水温 °C		比重 $\sigma 15$	栄養塩:無機態窒素 $\mu\text{g-at/L}$		クロロ フィルa値	病害 検鏡結果	
		今回	前回 11月17日	今回	今回	前回 11月17日	今回	アカ	ツボ
A. 吾妻(守山)	支柱	19.0							
B. 古部	支柱	19.2							
1. 神代	支柱	16.0	20.6	23.4	4.0	11.9	3.1		
2. 仲よし下	支柱	18.0	19.1	23.2	4.2	15.8	3.8		
3. 半田	支柱	17.7	18.8	23.0	6.6	45.0	3.7		
4. 三会	支柱	17.9	18.5	23.6	4.8	20.4	4.5		

※ 栄養塩の期待値は7.0 $\mu\text{g-at/L}$ 以上です。

●主な植物プランクトン (単位:細胞/mL)

植物プランクトン (優占種)	小型珪藻		大型珪藻	
	スケレトネマ属	キートセロス属	リゾソレニア属	コシノディスカス属
1. 神代				1
2. 仲よし下			2	
3. 半田	10	5	2	2
4. 三会			5	2

●調査結果概要

- ・水温は、16.0°C～18.0°C。海水比重(σ15)は、23.0～23.6。
- ・栄養塩は、4.0～6.6 μg-at/Lで、4観測点全てでノリ養殖における期待値7.0 μg-at/Lを下回りました。
- ・植物プランクトンは、リゾソレニア属・コシノディスカス属・スケレトネマ属・キートセロス属が確認されました。

2. 赤潮発生状況

- 佐賀県：赤潮は確認されませんでした。(11月25日)
- 福岡県：珪藻(コシノディスカス属)20細胞/ml(11月8日～)
- 熊本県：ヘテロシグマアカシオ 9,300細胞/ml (11月20日～)

3. 他県の情報

- 佐賀県：現在、展開作業が行われています。漁場によっては2～3枚の重ね網あり。(11月26日)。
- 福岡県：現在、漁場全域で網の展開作業が行われています。ノリ芽検診の結果では、最大葉長は5mm、最大葉長の平均は3.1mmと平年よりやや短めでした。(11月21日)。

4. 本県の情報

- 現在、展開作業、網洗いが行われています。