

地区	主たる魚種組成	漁獲量 (ト)	*1日1統当り 漁獲量(ト)	出漁 日数	1日1統当り漁獲量 (ト)	
					前週	前年
西彼	マイワシ(小・大羽)	46%	19	4	22	11
	マアジ(豆~中)	27%				
	ウルメ(小~大羽)	11%				
	マサバ(豆~小)	10%				
	その他のアジ類	6%				
132						
五島 奈留					2	2
北松 南部	マサバ(豆)	52%	426	6	16	16
	マアジ(豆~中)	43%				
	ウルメ(大羽)	2%				

漁業 種類	地 区	主たる 魚 種	大 き さ	漁 獲 量 (kg)	*1日1統当り 漁獲量(kg)	出漁 日数	1日1統当り漁獲量 (kg)	
							前 週	前 年
イカ釣	対馬東岸	スルメイカ				6		15
		ケンサキ	2~4段	4,000	30		36	57
	壱岐勝本	スルメイカ						155/日
		ケンサキ						24/日
	五島奈留	ケンサキ						0
定置網	五島有川						745	356
	五島魚目	カヅキ		469	117	2	450	546
	対馬西岸	ヒラマサ		1,595	266	3	134	106
	対馬東岸	ケンサキ		5,362	282	4	117	210
一本釣	北松宇久	ヒラマサ	4~8kg以上	667	222/日	3	212/日	227/日
	西彼野母	マアジ					26	19

注：前年の1日1統当り漁獲量は前年同月の数量を示す。
注：週間漁獲量は、標本データによる速報値です。
*：単位「/日」は、1日当たりの漁協水揚量を示す。
：詳細不明。

〔定地水温情報〕

(定置網設置水温計より)

令和 7年 11月 27日~ 12月 3日の平均水温

地 名	水 温	前 週 差	前 年 差	平 年 差
五島魚目	19.0	-2.1	+1.0	+0.1




注：平年差は今期の値と平年値（過去10年間の平均値）との差。

〔海面水温情報〕 MGSST（人工衛星水温）〔気象庁発表〕より

令和 7 年 1 1 月 2 7 日 ~ 1 2 月 3 日水温

人工衛星水温から下記定点水温を抜粋。

	水 温	前 週 差	平 年 差
対馬東	21.1	-0.8	0.5
五島西沖	21.4	-0.7	0.2
五島灘	22.2	-0.8	1.1



各定点は漁場図に示す（対馬東：A 五島西沖：B 五島灘：C）

平年値は過去 5 年間の平均値。